



66.912

1876/61.64

66.91

贵阳民间药草

贈閱

贵阳市卫生局編著

貴州人民出版社

廣西通志

廣西通志

貴陽民間藥草


貴陽市衛生局編著

62.3463
633

貴州人民出版社

1959年9月·貴陽

中科院植物所图书馆



S0042746

1876000

前 言

民間藥草是祖國醫藥寶藏的一部分，內容極為豐富，不但能到處採集，還具療效高，價格低廉，使用方便的特點。是民間醫長期以來使用民間藥草與疾病作鬥爭的寶貴遺產，經過不斷豐富與提高，極為廣大群眾所歡迎。正當我們鼓足干劲、力爭上游、多快好省地建設社會主義的時候，為了保障廣大勞動人民身心健康，對民間藥草的發掘整理，使其更好地為祖國的社會主義建設服務，是有其重大意義的。

我省山多，氣候溫和，適宜藥草生長；同時又是多民族地區，民間藥草的應用特別廣泛。民間醫經過長年累月與疾病作鬥爭，積累了很多的寶貴經驗，搜集了很多效用顯著的藥草。貴陽市民間醫藥人員在黨的中醫政策的光輝照耀下，掀起了獻方獻藥的高潮，參加獻藥的一百四十三人，共獻方二千五百二十個。經民間醫推出經驗豐富的代表，進行縝密的審查，上山採藥，辨清品種，交流經驗，通過長時期的反復討論，初步整理出草藥一百二十六種，編繪成書，定名為“貴陽民間藥草”。

本書收集的一百二十六種藥草，大多是貴陽市民間醫多數人長期應用的有效藥草；應用有效的新品種，經過選擇、總結，也收集在本書內；另外，其中某些品種，雖然本草綱目和本草綱目拾遺上有記載，但中醫和中藥店不用或少用，而為民間醫所使用，並有新的發展內容，也適當的收集在本書中。

本書收集的藥草，經民間醫上山採集新鮮標本；我們根據這些標本繪制圖譜，並列出科別，詳細敘述它的植物形態和生長地點，以便於醫藥工作者參考、研究和推廣應用。什麼時間採集，哪一部分入藥，也都作了說明。藥草的名稱，系採用本地區所常用的，別名則以較為普遍應用者為主。性味和效用，是根據貴陽市民間醫使用經驗所概括的。所列方劑，多是經常使用而療效顯著的；其餘方劑，限於篇幅，均未列入。由於缺乏整理、編寫經驗，又為水平和人力、時間所限，缺點和錯誤在所難免，希望本書讀者和廣大民間醫予以批評和指正。

目 录

一 划

一朵云…………… (1)

二 划

八爪金龙…………… (3)

八角莲…………… (6)

八角枫…………… (8)

三 划

三颗针…………… (11)

三角风…………… (13)

小种三七…………… (15)

土人参…………… (17)

土洋参…………… (19)

土知母…………… (21)

大烏泡…………… (23)

大风藤…………… (26)

大血藤…………… (28)

大种鹅儿肠……… (30)

大山羊…………… (33)

千年耗子屎……… (35)

子午莲…………… (38)

子母莲…………… (40)

马桑…………… (42)

万年芥…………… (44)

四 划

水皂角…………… (46)

水案板…………… (48)

水对叶莲…………… (50)

水白菜…………… (52)

水慈菇…………… (54)

水黄花…………… (56)

水馬桑…………… (58)

水八角莲…………… (60)

水冬瓜…………… (62)

五皮风…………… (64)

天青地白…………… (66)

天泡果…………… (69)

双肾草…………… (71)

反背红…………… (74)

毛青杠…………… (76)

见风青…………… (123)

见血飞…………… (125)

五 划

白侧耳…………… (78)

白顶草…………… (81)

仙桃草…………… (83)

对叶莲…………… (86)

对叶四块瓦……… (89)

玉枇杷…………… (91)

母猪藤…………… (93)

头晕药…………… (95)

六 划

地蜂子…………… (98)

地米参…………… (100)

地核桃…………… (102)

地星宿…………… (104)

血人参…………… (107)

竹叶菜…………… (109)

百尾笋…………… (111)

团经药…………… (114)

过江龙…………… (117)

羊屎条…………… (119)

尖惊药…………… (121)

观音草…………… (167)

观音柴…………… (169)

红活麻…………… (171)

七 划

佛顶珠…………… (128)

乱头发…………… (130)

辰沙草…………… (132)

豆豉草…………… (134)

歪揪串…………… (221)

折耳根…………… (245)

八 划

青竹标…………… (136)

青鱼胆草…………… (138)

青藤香…………… (140)

岩五加…………… (143)

岩豇豆…………… (149)

岩白菜…………… (145)

岩洋参…………… (147)

果上叶…………… (151)

刺藜根…………… (153)

刺老包…………… (155)

肾经草…………… (157)

狗牙瓣…………… (159)

夜关门…………… (161)

花蝴蝶…………… (164)

兔耳风…………… (177)

转珠莲…………… (267)

九 划

响铃草…………… (175)

独脚莲…………… (179)

胖血藤…………… (181)

香樟根…………… (183)

柳叶过山龙……… (185)

茗叶细辛…………… (187)

顺经草…………… (236)

追风伞…………… (197)

姜叶淫羊藿……… (199)

鸭舌草…………… (265)

十 划

倒触伞…………… (190)

胭脂花…………… (192)

透骨香…………… (195)

铁筷子…………… (242)

十 一 划

- 蛇泡草…………… (201)
蛇倒退…………… (203)
猪尾巴…………… (205)
猪鬃草…………… (207)
野油菜…………… (209)
野青菜…………… (211)
粘人草…………… (213)
堵拉…………… (215)
排风藤…………… (217)
梅花刺…………… (219)
鹿角刺…………… (233)
铧口草…………… (252)
阎王刺…………… (262)
鹅不食草…………… (271)

十 二 划

- 斑鳩窝…………… (227)
朝天罐…………… (229)
散血草…………… (232)
搜山虎…………… (234)
隔山消…………… (254)
黄瓜香…………… (223)

黄葵…………… (225)

十 三 划

- 路边金…………… (240)
骚羊古…………… (276)
矮陀陀…………… (258)

十 四 划

- 蜘蛛香…………… (248)
酸浆草…………… (250)
酸湯杆…………… (256)

十 五 划

- 蓼子草…………… (260)
簪鸡尾…………… (274)

十 七 划

- 翳子草…………… (269)

二 十 划

- 糯米藤…………… (278)

附 录

(001)

三 十

(002)

(003)

(004)

三 十

(005)

(006)

(007)

三 十

(008)

(009)

三 十

(010)

三 十

(011)

三 十

(012)

三 十

(013)

三 十

(014)

三 十

(015)

一 十

(016)

(017)

(018)

(019)

(020)

(021)

(022)

(023)

(024)

(025)

(026)

(027)

(028)

(029)

(030)

(031)

(032)

(033)

(034)

(035)

(036)

(037)

(038)

(039)

(040)

(041)

(042)

(043)

(044)

(045)

(046)

(047)

一 朵 云

别名：郎其細辛。

学名及科別：*Botrychium ternatum* Sw. 是蕨类瓶尔小草科植物
阴地蕨。

植物形态：系多年生宿根草本，生于山野阴湿处。冬季从根部独生营养叶一个，柄长直立，高約三至六寸，頂端分枝，呈二至三回羽状細裂，細鋸齒緣。春末自基部总柄上另抽生一孢子叶，有长梗，上端孢子囊穗集成圓錐状，孢子囊群穗状排列。根状茎多，略有分枝，肉質肥嫩，形似細辛，淡黄色。五月間地上部分即行凋謝。

药用部分及采集時間：全草入药，新鮮及干燥均可。一般二、三月間采集最好。

性味：甘、苦、微寒、无毒。

效用：热咳，虛咳，久咳，清肺热，止咯血。

方剂：治热咳 一朵云全草二錢至五錢，加白蘿卜、冰糖、煎水服。（如无白蘿卜可单用冰糖煎水服）

治虛咳：

1. 一朵云全草二錢至五錢，蒸瘦肉吃。

2. 一朵云二錢，姜叶淫羊霍根五錢，炖猪肉或猪心肺吃。

治虛咳久咳：一朵云，百味笋（宝鐸草），淫羊霍，各一两，煎水服。

治百日咳：一朵云，生扯攏，兔耳风，各五錢，煎水兌蜂糖服。

治小儿咳嗽：一朵云根五錢，煎水服。



一朵云

1.孢子囊穗；

2.叶

八 爪 金 龙

别名：开喉箭。

学名及科别：*Ardisia hortorum maxim.* 是紫金牛科植物百两金。

植物形态：为常绿小灌木。多生于阴湿山林沙石土中，以及岩石旁，溪谷中。高约一至三尺。茎圆形，外表棕红色，下部分枝少，上部枝梢或叶腋多抽小枝，叶互生，披针形或长椭圆形，柄短，叶片厚，端尖，基部阔楔形，浅波缘或全缘，时有波形反卷，叶面深绿色，叶背淡绿色。两面均散有棕色圆形小点。叶背脉微凸出，羽状网脉。夏日小枝顶端簇生小花，排列呈繖房花序；花白色带紫红，五瓣深裂、钟状，裂瓣长卵形，雄蕊五枚，“个”字形，花丝极短，雌蕊一个，子房球形，花柱细长。花后结红色球形核果，上散有赤褐色斑点，且附宿萼，内含种子一粒。地下根多分枝，圆柱形，肉质肥壮。

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。以根最常用。

性味：辛、苦、寒、无毒。

效用：祛风清热，活血止痛，为治风火喉痛之要药。

方剂：治风火喉痛，喉蛾（扁桃腺炎）：

1. 八爪金龙四钱，煎水服或口含或研末吹在喉部。
2. 八爪金龙四钱，射干四钱，煎水吃。（如大便不通加大黄，发热加马鞭草）
3. 八爪金龙三钱，桔梗三钱，煎水服，或同研末用开水吞服。
4. 八爪金龙二钱，山豆根二钱，麦冬二钱，桔梗二钱，薄荷二钱，甘草二钱，加水煎服。

治牙痛：

1. 八爪金龙一钱煎水服，或用少许噙在痛的牙上。

2.八爪金龙三分，地胆五分，苦金盆五分，研末置患处或內服。

治风火咳嗽：

1.八爪金龙，煎水服。

2.八爪金龙，龙胆草，研末，馬鞭草，車前草，煎水，同吞服。

治白口疮：八爪金龙細末，吹于喉部。

治中风、开窍：八爪金龙一分，路粉（白狗粪）一分，冰片少許，研細混勻，做开关散吹入口內。

治心气痛：八爪金龙一錢，乳香二錢，搗烂，开水吞服。

治风湿疼痛：八爪金龙，鉄筷子，研末，酒吞服。每次一錢。

〔治家畜喉风〕：八爪金龙一两，野棉花根五錢，煎水灌服。



八爪金龙

1. 植物全形； 2. 花； 3. 花萼和雌蕊；
4. 雄蕊； 5. 果实。

八角蓮

別名：旱八角，叶下花。

學名及科別：*Podophyllum pleianthum* Hance 是小蘗科植物八角蓮。

植物形态：為多年生宿根草本，地下根莖黃褐色，粗壯，環節狀排列，每年增生一節，狀似黃精，節上葉基的殘痕大而明顯，稍凹，周圍有細環紋。根莖下側生多數較粗的鬚根，根上密被黃棕色茸毛。初春發苗，單生，莖肉質肥壯，上生細毛，基部有三至五片較大的鱗葉。莖頂生葉，單生或對生，有長柄。葉片肉質近於圓形，掌狀深裂或半裂，每一裂片又三淺裂，邊緣有疏鋸齒，葉脈自葉片中央向四周放射；呈掌狀網脈，主脈為八條，葉面深綠色，葉背淺綠色，微帶紫紅有光澤。主脈突出，明顯；三四月間莖頂端抽花梗，聚繖花序，花多為三朵，兩性，整齊，具長柄，萼片六瓣，離生，二輪排列，外層較內層略大，長卵形，均為淺綠色，易脫落，花冠深紫色，六瓣離生，二輪排列，長卵形，雄蕊六個，肥壯，花藥黃色，基部狀如葉柄，深紫色，雌蕊一個，子房上位，柱頭雞冠狀分裂。花後結橢圓形漿果。

藥用部分及採集時間：春末夏初採地下根莖及根入藥。

性味：辛、香、微苦、平、無毒。

效用：補虛弱，解百毒，治蛇傷，疔瘡。

方劑：治腎虛：八角蓮根莖一至九節，血人參五錢，炖肉或蒸雞吃。

治癆傷：八角蓮五分為末，用酒吞服。

治體虛氣弱，神經衰弱，癆傷咳嗽，虛汗盜汗：八角蓮三錢，蒸鴿子或炖雞，或炖豬肉半斤內服。

治疔瘡：八角蓮二錢，蒸酒服。并用鬚根搗爛（如干者則磨酒或淘米水）敷患處。



八角蓮

1. 植物全形, 2. 根茎, 3. 花,
4. 雄蕊, 5. 雌蕊, 6. 果实。

八角 楓

别名：根名白金条，鬚根名白龙鬚。

学名及科別：Alangium Chinense (Lour.) Rehd. 是八角楓科植物八角楓。

植物形态：为落叶灌木或小乔木，高达一丈五尺。多自生于山野林丛中，树皮淡灰色，嫩枝綠色或淡黃色，有毛。叶互生，有长柄，叶柄嫩时有毛，叶片卵形或圓形或倒闊卵形，基部不对称，一面寬闊，一面斜上，叶緣为全緣或二至七浅裂，裂片多呈三角状。叶面深綠色，叶背淡綠色，嫩叶两面多毛，老叶細毛稀少，掌状网脉，主脉多为五条，中間側脉多为梯形。五至七月，叶腋抽聚繖花序，上生九至三十朵小花，萼鐘状，頂端六至八齿裂，花瓣与萼同数，白色或淡黃色，綫形，成熟时反卷，雄蕊扁而有毛数与花瓣同，雌蕊一个，与雄蕊等长，子房下位，花柱細长，柱头三裂，花后結黑色卵形漿果。

药用部分及采集時間：根及鬚根以及近根树皮入药。四季皆可采收。

性味：辛、热、力猛，有毒。

效用：驅风鎮痛，治风湿麻木癱瘓，跌打損伤。

方剂：治风湿麻木：

1. 白金条：男用二錢五分，女用一錢五分，泡酒六兩，每次服藥酒五錢。
2. 白龙鬚七分，熬甜酒吃。
3. 白龙鬚一錢，炖肉一斤服用（淡盐，忌酸）
4. 八角楓根皮（白金条）二兩，用烧酒二斤浸泡，每服五錢，时常服用。

治风湿麻木癱瘓：

1. 白龙鬚二錢，野青菜四錢，猪肉半斤，將藥切碎炖肉，

一次服完。（服后十二小时内麻木出汗，手脚无力）。

2. 白金条三錢，紅活麻三錢，岩白菜一两炖肉吃。

治鹤膝风：白金条的节五錢，松节三錢，紅白牛膝各三錢，切細，加烧酒一斤浸泡，每服药酒五錢。常服用。

治跌打损伤：白龙鬚三錢，牛膝（醋炒）一两童便为引，煎服。日服三次（一日服完）

治劳伤腰痛：白金条三錢，牛膝（醋炒）一两，生杜仲一两酒水各六两，蒸服。

治半身不遂：白金条一錢五分，蒸鸡吃。

治伤后发寒：白金条皮三錢，細辛一錢，閻王刺三錢，老姜五錢，加水煎湯內服。如有伤口則用八角枫叶为細末外撒。

治乳結疼痛：八角枫叶数十张，抽去粗筋，搗烂敷中指（左乳痛敷右中指，右乳痛敷左中指）輕者一次，重者三次。

治刀伤出血：八角枫叶为細末，撒于伤口上，可防止破伤风。

禁 忌

1. 本药有剧毒和麻痹作用，服药后，现麻痹萎軟，孕妇忌服。
2. 用量：白龙鬚每次不能超过一錢，白金条每次不能超过二錢。
3. 如多用中毒，可用萝卜子煎水服能解。
4. 服此药后应忌魚一百天。



八角枫

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1.花枝; | 2.果枝; | 3.花; |
| 4.雄蕊; | 5.雌蕊; | 6.果实。 |

三 顆 針

別名：刺黃連，鷄脚刺。

學名及科別：*Berberis chingii* chen. 系小檗科植物秦氏小檗。

植物形態：系落叶灌木，野生于山坡上，干茎丛生、高約一米。皮褐色，有縱的細稜紋，断面淡黃色，老莖及皮層黃色更深。葉三至七片丛生，每丛葉下有三顆尖刺，故俗名三顆針。葉具短柄，葉片披針形或長倒卵形，綠色，革質，有光澤，（老葉略帶紅色），葉端略尖，基部楔形、微鋸齒緣，齒上具有小尖刺，羽狀網脈，葉背主脈凸出。春日葉丛中開多數黃色小花，花莖極短，基部有十數個卵圓形的苞片，小花具長柄，十數朵丛生排列成繖形花序。花后結長橢圓形漿果，初呈綠色，成熟后呈黑紫色，其地下根粗長堅硬，断面鮮黃色。

藥用部分及採集時間：不分四季，掘根入藥。

性味：苦寒無毒。

效用：清火解毒，健胃明目，治濕熱黃疸。

方劑：

治火眼：三顆針用人乳磨，或用它蒸人乳，點眼。

治風火眼赤腫痛：三顆針一兩，鉄掃帚尖葉一兩，十大功勞一兩，黃連一錢，礬砂一錢，上冰片二分。

將前四味藥放入素沙鍋中，加清水三斤，煎一小時，再將礬砂加入，用文武火煎半小時后，用白細布濾除藥渣，加冰片入藥水中，用玻璃瓶封裝，一星期后取用。


用法：用白灯草一條，調藥水點眼。

治濕熱黃疸：三顆針一兩，煎水吃。

治毒瘡：三顆針煎水洗患處。

治黃水瘡：三顆針葉干燥研末，撒于瘡上能收黃水，如發痒可加麻油或菜油調敷。

治毒瘡發癢：三顆針五錢，千里光五錢，薄荷五錢，食鹽三錢，一級青茶五錢，開水浸，蓋緊，取浸液溫洗傷處。



三顆針

1. 果枝, 2. 花枝, 3. 花序。

三角风

学名及科别：Hedera helix L. 是五加科植物常春藤。

植物形态：为蔓生常绿木质藤本。全长数丈，野生于山林峭壁上或树身上。茎圆柱形，表面灰褐色或绿色，处处有气生鬚根。叶互生，有长柄，叶片卵圆形，先端尖，多为三角浅裂，偶有五裂及全缘的。基部心形或圆形，革质而厚，叶面深绿色，略有光泽。叶背淡绿色，掌状或羽状网脉，有三至五主脉，晚秋时期开繖形花序，花小两性，整齐，萼绿色，五片，花瓣五片离生，淡黄绿色，雄蕊五个，花后结浆果，球形，熟时呈黑色。

药用部分及采集时间：不分四季，采全草入药。

性味：苦、温，无毒。

效用：风湿疼痛，瘫痪麻木，并作薰洗药。

方剂：治口眼喎斜：三角风 五钱，白风藤 五钱 钩藤 七个，泡酒一斤，每服药酒 五钱，或蒸酒适量服用。

治风湿筋骨冷痛：三角风根 一两，泡酒半斤，每服一两，并用全草熬水洗。

治风湿疼痛麻木瘫痪：三角风 四两，千里光 四两，双钩藤 三两，红活麻 二两，大风藤 二两，大山羊 二两，阎王刺根，熬水薰洗。

治肤痒：三角风全草 一斤，熬水沐浴，每三天一次，经常洗用。



三角风

1. 果枝; 2. 花枝。

小 种 三 七

别名：养鸡草。

学名及科别：*Sedum Kamtschaticum* Fisch et Mey. 是景天科植物费菜。

植物形态：多年生宿根草本，高约一尺多，山野自生或庭园栽培。地下宿根粗壮，肉质，春日发芽，数茎自根部丛生，茎圆柱形，绿色，肉质。单叶互生，无柄，叶片椭圆形或倒卵形，肉质，绿色，且有光泽，上半部边缘锯齿状，下半部全缘，先端尖，全株光滑无毛。夏日茎顶分枝，着生多数黄色小花，排列呈聚伞花序，萼片绿色，五瓣离生，卵状披针形，先端钝圆。花瓣鲜黄色，五片，披针形，离生，先端尖，雄蕊十个，着生于花瓣基部，花丝细长，花药卵圆形，雌蕊五个，离生，花后结蓇葖果五个。

药用部分及采集时间：根或全草入药，根，夏秋掘取，全草随采随用。

性味：酸、苦、微寒，无毒。

效用：活血止血，接骨续伤，烧伤刀伤，解毒消肿。

方剂：治跌打接骨：小种三七，野葡萄根，酸浆草，先将前二味药捣烂，另将酸浆草煎水和匀，敷伤处，用杉木皮包扎。

如发热红肿，加生大黄末相调即可。

另用仙桃草五钱，煎水内服，酒引。

治跌打损伤：1.鲜小种三七叶适量，捣烂加甜酒，外敷伤处。


2.小种三七根，煨酒服。

治烫伤，烧伤，痛疮：小种三七嫩叶尖，捣烂敷之。

治小儿瘰疬：小种三七嫩叶尖七个，蒸肉吃。

治大肠出血 鲜小种三七一两，炖酒吃。

（治鸡骨折）：小种三七捣烂敷之，有特效。



小种三七

1. 植物全形； 2. 叶； 3. 苞片； 4. 花，
5. 萼片； 6. 雄蕊； 7. 雌蕊。

土 人 参

别名：土高丽参

学名及科别：*Talium, craissifolium willd.* 是馬齿莧科植物栝兰。

植物形态：为一年生草本，直立，高約二尺，生于山坡阴地或园庭栽培。茎圓柱形，下部多有分枝，除基部稍帶木質外，其余皆为肉質，綠色。叶互生，具短柄或几无柄，叶片倒卵形或橢圓形，上部小叶披針形，先端尖或鈍，全緣，基部漸狹窄，羽状网脉，中脉明显。側脉不易察觉，肉質肥厚，深綠色，夏日茎端抽花梗，上生多数小花，排列呈圓錐花序；萼二片，早脫落；花冠紫紅色，五瓣整齐；雄蕊数十个，花絲細长，雌蕊一个，子房球形，花柱細长，柱头三裂，蒴果。种子細小黑色，扁圓形，有凸起小点。

药用部分及采集时间：夏秋間掘根入药。

性味：甘（微苦）平，无毒。

效用：补气生津。

方剂：补虛弱及病后体虛未复：土人参一两至二两炖肉或炖鸡吃。



土人參

- 1.植物全形； 2.根； 3.4.花；
5.雌蕊； 6.果实； 7.种子。

土 洋 参

别名：盘龙参，米洋参

学名及科别：*Spiranthes australis* Lindl 是兰科植物綫草。

植物形态：为多年生草本，自生于荒坡草地。地下根圆柱形，数条根簇生，肥嫩多肉，叶互生，靠近根部近似丛生或仅有叶的残基。初夏抽茎，高约尺许，茎瘦长绿色，草质。茎上叶长披针形或线形，绿色，先端尖，全缘，基部抱茎，平行脉，上部叶细小鳞片状，初夏、茎顶上生多数小花，呈穗状花序，小花弯曲顺次排列，盘旋上升、状如盘龙，颇为美丽。每朵花有苞片一枚，长卵形，花被六瓣，不整齐，密生腺毛，二轮排列，外轮二片对生披针形，其他一片呈卵圆形，内轮二片同形，呈角状，余者为唇瓣，白色，呈鸡冠状。

药用部分及采集时间：夏日采根入药。

性味：甘、微苦、平，无毒。

效用：补气强壮。

方剂：补气治虚弱：土洋参 五钱，炖肉吃，或用一两煎水吃。

病后虚弱滋补：鲜土洋参一两，豇豆根 五钱 蒸猪肉半斤或子鸡一只内服，每三日一剂，连用三剂。

治头昏、虚弱、气短：土洋参 五钱，煮油汤吃。

止咳：土洋参 三钱，加冰糖及水，蒸服。



土 洋 参

1.植物全形； 2.花的正面观； 3.花的侧面观。

土 知 母

別名：中搜山，鵝參七，鴨屁股。

學名及科別：*Iris tectorum maxim.* 是鳶尾科植物鳶尾。

植物形态：為多年生草本，高約二尺，多野生于山坡草丛中。地下莖圓柱形，并有凸出的圓錐形結节，形如鴨尾部的皮脂腺，其上生多数須根。草叶互生，二行排列，綠色，叶片大，形似劍，全緣，直走平行脉，先端銳尖，基部較大，且分成两片交替包围他叶基部，外側白色，內腹呈膜質，三、四月間从叶丛中央抽花莖，綠色，扁圓形或圓柱形，开花一至二朵，花有柄及包叶；花被紫色，六瓣，兩輪排列，外层三瓣形大，上面有黑白斑点，且腹面有鸡冠状突起；內层三瓣略小，无斑点；雄蕊三枚，藏于柱头裂片下面，花絲长，半透明；雌蕊一个，子房三室，中軸胎座，花柱大部分与花被管合生，柱头三裂，裂片紫色，形如花冠，花后結蒴果，綠色，內含多数种子。

藥用部分及采集時間：根莖入藥。四季皆可采收。

性味：辛、寒、微毒。

效用：消积，通便。

方剂：食积飽胀：

1. 土知母一錢，研細用白开水服下。

2. 土知母研細，兌酒吞。

用量：成人不能超过一錢，小儿不超过三分，虛弱者禁用。



土 知 母

1. 根茎和基叶； 2. 花枝； 3. 示雄蕊柱头的裂片；
4. 雌蕊； 5. 果实； 6. 果实横断面。

大 烏 泡

别名：烏泡倒鈎傘。

学名及科別：*Rubus hakonensis*, Franch et Sav 系薔薇科植物深山寒莓。

植物形态：为蔓生灌木，长三至五尺，多生于山野道旁或灌木丛中。全身被有褐色硬毛、茎圓形、散生小尖刺。单叶互生，叶柄长，圓柱形，托叶細小两片，叶片掌状心形，有三至五浅裂，先端短尖，細鋸齿緣，紙質，掌状网脉。夏日枝稍或叶腋抽圓錐花序或总状花序，萼五裂，灰白色；花瓣白色，五片，薔薇形。花后結球形果实，熟时呈紅色。

本品与寒莓 (*Rubus buergii*, Miq) 。易于混淆，但寒莓全身密被細微白毛，不生小刺，花序不相同，苞片为羽状細裂。

药用部分及采集時間：根及茎叶入药，四季均可采收。

性味：苦、涩、平。

效用：叶，解毒消肿；根，补虛。

方剂：治色弱：大烏泡根二两，炖猪肉吃。

治黄水疮：用大烏泡叶为末外搽。

治足上葡萄花（靜脉曲张）：大烏泡叶，冬苋菜等分与甜酒捣烂，敷数次。



大烏泡



寒 莓

大 风 藤

学名及科别: *Coculus trilobus* Dc. 是防己科植物木防己。

植物形态: 落叶木質藤本，长可达二至三丈，野生于山林岩石上或路旁，全身密被短絨毛，尤以叶片为多。地下根圓柱形，橫断面有明显的放射状木部組成的菊花紋。茎圓柱形，綠色、坚韧，蔓生或纏繞他物上升，頂部常有分枝。叶互生，有长柄，叶片广卵形或心脏形，有三至七个浅裂（以三裂为多）先端尖或鈍尖，基部微凹或近于截形，革質，較厚，叶面深綠色，叶背灰綠色，掌状网脉，中脉显著，夏日叶腋开圓錐花序。雌雄异株，花小，黃白色，具短柄，雄花有苞二片，萼六片二輪排列，且外輪較小，花瓣六片，瓣片基部兩側呈耳状，雄蕊六枚，花药呈十字形，浅裂成四小球形；雌花花序較短，且数目較少，萼和花瓣均六片，有退化雄蕊六个，不具花药，子房三角形卵状。核果近球形。

药用部分及采集时间: 不分四季，掘根入药。

性味: 苦，溫，无毒。

效用: 驅风除湿，舒筋活血，治风湿关节痛。

方剂: 治风湿一身酸痛：

1. 大风藤一两，泡酒半斤，每服一两。
2. 大风藤一两五錢，石南藤一两，木通七錢，松节七錢，生姜二片为引，煎水服，連服二剂。
3. 大风藤、小风藤、石南藤、大血藤、小血藤、矮陀陀、五味藤、木通、厚朴、川芎各三錢，泡酒服。
4. 大风藤三錢，大血藤三錢，观音草三錢，木通二錢，見风青三錢，見血飞三錢，鉄筷子三錢，杜仲二錢，香樟根二錢，泡酒二斤，每服一两，每天二次。

治經期腹痛: 大风藤五錢，石菖卜三錢，团經药二錢，紅花二錢，加水煎湯內服。

治小儿急惊风: 大风藤三錢，銀花三錢，閻王刺二錢，白菊花一錢，阳雀花根二錢，荷叶二錢，尖惊药二錢（如系女孩，則用等量的团經药代）加水煎湯，一日分二次服完。



大风藤

1.枝条; 2.根; 3.花; 4.雄蕊。

大 血 藤

别名：母猪大血藤。

学名及科别：*Ampelopsis* sp. 是葡萄科植物

植物形态：为多年生草质藤本，长约三至五尺，多生于山野灌木丛中或道旁。地下有根数条，肥壮多肉，断面淡红色，全身密被短毛，茎圆柱形，有节，节处膨大，茎基部木质上部草质，与叶对生处生分枝状的卷鬚，叶互生，多为三出复叶或三裂掌状单叶，叶柄长，多向下弯曲，基部膨大，小叶两侧的为卵状歪形，中间的为椭圆形，先端尖，边缘有大小不等的锯齿，基部不对称，楔形或心形，叶面深绿色，叶背绿色，网脉；夏日节上抽花梗，花小多数，排列成繖房状的聚繖花序，萼五片，细小绿色，花瓣米黄色五片，雄蕊五个，雌蕊一个，子房上位球形，花后结球形浆果，成熟后为黑紫色。

药用部分及采集时间：根入药，四季均可采收。


性味：辛，平，无毒。

效用：行血活血，治跌打损伤。

方剂：治跌打损伤，筋骨疼痛：大血藤二两，切片泡酒半斤服，每服一两。

治误吃螞蝗方：

1. 大血藤煎水兑古墓中的石灰研末，调蜂蜜开水服。另服使君子白蜂蜜，每日早晚服下，颇有效。
2. 大血藤末调鸡蛋清置鼻孔，并内服适量。



大血藤

- 1.根和茎基； 2.枝，示卷鬚； 3.花枝；
4.花； 5.果序； 6.果实横断面。

大 种 鵝 儿 腸

别名：黑牽牛，通經草。

学名及科別：*Stellalia paniculigera*, Makino. 系石竹科植物大繁縷。

植物形态：为多年生宿根草本，自生田野土坎或山坡地带。地下根圆柱形，多可达十数股，白色肉质肥壮。全身密被细毛，茎纤细软弱，长三至四尺，直生或蔓生，单叶互生，无柄，叶片披针形，先端尖，全缘，基部渐狭，绿色，羽状网脉，秋日顶生或叶腋间抽圆锥状聚繖花序；萼五片，披针形，花瓣五片白色，整齐，离生，瓣片二裂。花后结小球形浆果，熟后呈黑色。

药用部分及采集时间：夏秋采根或全草入药。

性味：辛，平，无毒。

效用：行血理气，通经解毒，湿热积滞。

方剂：治黄疸：大种鵝儿腸全草（鲜）一至二两，煨水吃。

老年心悸：大种鵝儿腸粉末五分，蒸肉丸子汤早上空腹吃。

治胃胀痛：大种鵝儿腸根末五分至一钱，毛米汤吞服。

治周身痠痛，妇女小腹胀痛，大种鵝儿腸根末五分至一钱，用酒吞服。

治疗疮：鲜大种鵝儿腸根捣烂敷之，干者为末，调水敷亦可。

治筋骨疼痛屈伸不利：大种鵝儿腸、铁筷子、閭王刺、香樟根、见血飞、石南藤、大小血藤、木通、木瓜、牛膝、南布正、伸筋草各一钱泡白酒半斤，每次服七钱至一两，一日三次，忌与生冷食物同服。


治小儿积食，消化不良，大种鵝儿腸一钱，鸡内金一钱，研细末混合，开水吞服。

治大肠下血，便后流血如注：大种鵝儿腸二钱，青藤香二钱，炖猪肉半斤，汤肉并服。

治鶴膝風，膝關節腫痛：大種鵝兒腸五錢，紅牛膝五錢，紅活麻根五錢，大風藤五錢，細切，加燒酒半斤浸泡；每次一至二兩，常服用。

調經種子：大種鵝兒腸三錢，紅牛膝二錢，月月紅一錢，加紅糖蒸，去渣服汁，隔日一劑，連用一月。

治月經不調：大種鵝兒腸三錢，團經藥三錢，木通二錢，益母草二錢，小血藤二錢，杜仲三錢，紅花一錢，紅糖一兩，蒸燒酒四兩，分五次服完。



大种鹅儿肠

1. 植物全形, 2. 根和茎基, 3. 花。

大 山 羊

别名：大騾羊

学名及科别：芸香科植物。

植物形态：为多年生常绿灌木，野生于山野灌木丛中。地下有粗大的木质根。茎直立，高约三至四尺，圆柱形，灰白色并具有斑点。单叶互生，柄较长，叶片倒卵形或椭圆形，先端尖，全缘，基部阔楔形，叶面浓绿色，叶背淡绿色，羽状网脉，革质。春日叶腋抽穗状花序。

药用部分及采集时间：根部入药，四季均可采收。

性味：辛，苦，寒，无毒。

效用：清风热，治咳嗽，喉痛，热痢。

方剂：治热咳喉火牙痛：大山羊一两，煨水内服。

治肾囊出汗：大山羊研末二两，每次五分至一钱，油汤吞服，日服二次。

治湿热痢：大山羊根五钱，加糖吃。

治百日咳：大山羊半斤，五皮风六两，水一斤半，煎成一半过滤，装入瓷瓶中，每日服三次，一至三岁小孩每服三钱，余酌量增加。



大 山 羊

1. 枝条； 2. 根。

千年耗子屎

别名：紫背天葵，地丁子。

学名及科别：*Semiaguilegia adoxoides* (De) Makino

是毛茛科植物天葵

植物形态：为多年生宿根草本，生于山坡或路旁土质疏松处。地下块茎为椭圆形或纺锤形，外部灰褐色，内部白色，肉质，上生鬚根，秋末发叶春末凋谢。根生叶是多数丛生，具长柄，叶柄基部膨大呈鞘状，三至四出复叶或掌状深裂，叶片又多二至三深裂，每裂片又有浅裂。先端钝圆，基部楔形，叶面绿色，叶背紫色，光滑无毛。冬末基部抽一至数个花茎，茎绿色，纤细圆形，被有细毛，顶端分枝。茎上叶形似根生叶，但多为三数深裂，且柄短，多变成鞘状包着茎。初春茎顶或叶腋开小花：单生，萼五片离生，花冠五片，白色或微带淡红色，基部联成短筒状，雄蕊十个，雌蕊三至四个，花后结蓇葖果，多为四个，成熟时，沿腹部开裂。

药用部分及采集时间：块根及种子入药（主要是块根），春末夏初挖取根部，春末采集种子。

性味：甘、寒、无毒。

效用：清热解毒，化结止痛，消瘰癧，治癫痫，疮毒：蛇咬伤小兒惊风。

方剂：治胃热气痛：千年耗子屎二钱，捣烂或嚼烂，开水吞服。

治瘰癧：千年耗子屎二钱，捣烂或嚼烂内服，外用适量嚼烂敷患处。

治九子痒：

1,千年耗子屎种子适量，加猪尾巴(草药名)同捣烂，外敷。

2,千年耗子屎同醋捣敷，并用千年耗子屎种子三钱，煮鲫鱼或猪肉服。

治乳痛红肿：千年耗子屎种子五钱，煎水吃。

治乳痛：千年耗子屎种子 七錢至一两，搗烂以好酒煮沸冲服，或酒水各半煎服。

消紅肿：千年耗子屎种子，搗烂敷患处。

治毒疮：千年耗子屎种子，搗烂敷患处。

治肺癆：千年耗子屎 四两，放在一只大猪肚子內，煮烂去渣吃，連吃三只。

治虛咳化痰：千年耗子屎 三錢，炖肉吃。

治母猪瘋，羊癩瘋：千年耗子屎 五至七顆（約一錢），研成細末，发病前用烧酒吞服，連用三至五剂。

治惊风：千年耗子屎种子干末 五分，开水吞服。

治眼翳：千年耗子屎根 五个，搗取汁合人乳点服。

治眼翳初起：千年耗子屎搗烂貼于太阳穴（患左貼右，患右貼左），起泡即取去。

治紅崩白帶：千年耗子屎种子 五錢，熬甜酒吃治白帶，熬紅糖吃治紅崩。

治蛇咬伤，千年耗子屎 二錢，于患者口中嚼烂后敷患处，一日一換。



千年耗子尿

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. 植物全形; | 2. 雄蕊和雌蕊; |
| 3. 花瓣状的萼; | 4. 花瓣, 示正面和侧面; |
| 5、6, 果实; | 7. 种子。 |

子 午 蓮

別名：腰帶蓮。

學名及科別：*Nuphar japonicum*, Dc. 系睡蓮科植物萍蓬草。

植物形态：為多年水生草本，生淺水池沼中，高約二至四尺，（多隨水的深淺而增減），根莖在泥漿中橫生，長可達五尺，粗大扁圓形柔軟，上有許多黑褐色葉基殘痕，形似白花，下側生白黑色鬚根，上側多分生短莖。單葉叢生于根莖的上端，具長柄，葉柄肉質白色，基部稍寬，向上漸漸細小呈圓柱形，葉片廣卵形或卵狀橢圓形，浮水者質厚平展，沉水者質薄皺縮，先端鈍圓，基部深心形或箭形，全緣，綠色，光滑無毛。夏日葉叢中抽花梗，圓柱形粗壯，上生一花，伸出水面，花萼鮮黃色，形如花冠，五片離生，整齊，倒卵形；花瓣細小黃色多數，隱藏于雄蕊基部；雄蕊多數，梯層狀排列，約三至四層，底層最大，向上漸漸變小，花藥黃色，“个”字形，着生于花絲頂端。花絲扁平肉質，雌蕊一個，子房上位，廣卵形，柱頭有十個左右的溝槽，呈放射狀，邊緣齒裂，蒴果，長卵形，萼宿存，由黃色轉綠色復蓋于果實周圍。

藥用部分及採集時間：地下莖入藥，四季皆可採收。

性味：甘，平，無毒。

效用：治癆熱骨蒸盜汗。

方劑：治子午燒：子午蓮 五、六錢 炖肉服。

治虛汗：子午蓮 一兩，四塊瓦根 五錢，炖排骨吃。

治肺癆哮喘：子午蓮 二兩，白芨 四錢，炖肉吃。



子午蓮

1. 植物全形； 2. 根茎；
 3. 去花萼的花，示花瓣、雄蕊和雌蕊；
 4. 雄蕊； 5. 雌蕊； 6. 果实横断面。

子 母 蓮

別名：毛海參。

學名及科別：Nymphaea tetragona Georgi Var. angustata Casp.
subr. orientalis casp. 系睡蓮科植物睡蓮。（圖十九）

植物形態：為多年生草本，多生于淺水池沼中。地下有頭狀根莖，紫黑色，上生多數黑色肥嫩鬚根。葉從根莖叢生，葉柄細柔而長，綫形，白嫩，葉片長出水面浮生，廣卵形或近圓形，先端鈍圓，全綠，基部箭形深裂，肉質，綠色，掌狀網脈，秋季抽花梗，梗端單生一花；花通常子午時開放，萼四片、綠色；花冠白色多數，雄蕊多數外圍的成花瓣狀，花后結圓形蒴果，花梗漸次下垂，成熟時裂開，內藏多數種子。

藥用部分及採集時間：根莖入藥，隨時可採。

性味：甘，鹹，微寒，無毒。

效用：滋陰潤肺，止咳，消虛腫。

方劑：咳嗽痰中帶血：

1. 子母蓮每次用二兩，炖心肺服。

2. 子母蓮五錢，仙鶴草五錢，一朵云三錢，煎水服。

補虛弱：子母蓮每次用三兩炖豬殺口肉或炖雞服。

治神經衰弱，夢遺：子母蓮和夢花根各五錢，蒸雞或炖肉吃。

治虛腫：子母蓮二兩，糯米二兩炖肉服。

治哮喘：子母蓮一兩，地蜂子五錢，過路黃（金絲梅）五錢、煎水服。



子 母 蓮

1. 植物全形, 2. 花。

马 桑

别名：馬桑柴。

学名及科別：*Coriaria sinica* Mixim 是毒空木科植物馬桑。

植物形态：为落叶灌木，高可达丈余，野生于荒山坡和路旁。枝叶繁茂，树干及枝条表面有多数白色斑点（即皮孔）叶对生，有短柄或无柄，叶片稍厚卵圆形，叶面鮮綠色，两面均平滑无毛，网状脉，有主脉三至五条，中脉两侧的主脉呈弧形。初春抽总状花序，萼五片，复瓦状排列，花瓣五片黄色，比萼片小，雄蕊十枚，具短花丝，雌蕊一个，子房上位，花后結浆果样的果实，初为鮮紅色，熟时轉变成黑色。

药用部分及采集時間：药用根和叶，夏季采叶，根可随时挖掘。

性味：辛，苦，麻，气悶臭，有大毒。

效用：外治疮毒，并为杀蛆杀虫要药。

方剂：杀蛆：馬桑枝叶搗烂或砍碎，放入粪池内。

农业上杀虫：


1. 馬桑茎叶，犁田时放入田内，可防止病虫害。

2. 馬桑叶，核桃叶，牛虱子草，烏头，野棉花根，晒干为末，撒布受虫害的农作物上（放入粪坑内亦可杀蛆）。

治毒疮：馬桑叶研末，調麻油外搽。

治疥疮：馬桑叶，地星秀等分，打成細末，調过灯油搽患处。

治疯狗咬伤，馬桑根三錢至五錢，煎水服。



馬 桑

万年荞

别名：苦荞头、野南荞。

学名及科别：*Polygonum tataricum* Linn. 系蓼科植物韃靼荞。

植物形态：为多年生宿根草本，高约二至三尺多生于荒地、道旁或水沟边。地下根茎粗大，拳状，上生许多细根。地上茎直立或斜生，圆柱形，多中空，绿色，有节，节处略膨大，单叶互生，托叶呈鞘状包着茎，叶柄长，茎部略为膨大，叶片卵状心形、或三角形，先端急尖或锐尖，全缘且有微毛，茎部戟形、绿色、质柔软，两面均密被细绒毛，网状脉。夏日叶腋或茎顶抽花梗，上生许多小花，排列呈复穗状花序，花两性、整齐、单被，花被五片，淡紫色、雄蕊五个、雌蕊一个，子房上位，柱头三裂，花后结黑色三棱卵形瘦果。


药用部分及采集时间：根茎入药，四季均可采收。

性味：涩，平，无毒。

效用：消食化气。

方剂：消食化气：

1. 万年荞二至三钱、胡桃仁适量，同嚼服（本药较硬，单独嚼不动与核桃仁同嚼则软化）。
 2. 万年荞六两、泡酒一斤，每服酒一两（饭前服）。
 3. 万年荞五钱、硃砂莲二钱、芡藜根五钱，煎水服。
- 治胃痛：万年荞末六钱、香樟根皮末三钱、研末混匀，分为一钱一包，每日三包、饭前用开水吞服、三日服完。
- 治小儿疳积：万年荞，鸡屎藤，臭牡丹各四两为末，调面粉（荞麦面更好）作粑吃。
- 治痢疾：万年荞五钱，硃砂莲二钱，煎水服。



万年荞

- | | | |
|----------------|-----------|--------|
| 1. 植物全形; | 2. 根茎; | 3. 花; |
| 4. 花剖开, 示雄蕊着生; | 5. 雄蕊; | |
| 6. 雌蕊; | 7. 子房横断面; | 8. 果实。 |

水 皂 角

学名及科别：*Cassia nomame* (sieb.) kitag 系豆科植物山扁豆。

植物形态：为一年生草本，多生于荒坡草地及路旁。主根明显，茎直立或卧地斜生，长尺许，绿色，分枝多，密被柔毛。叶互生偶数羽状复叶，小叶几无柄，披针形或长卵形，微有细毛，先端短尖，全缘、绿色羽状网脉，夏日叶腋抽花梗，上生一至二朵花，萼五瓣深裂，密生细毛，花冠黄色五瓣离生，倒卵形，雄蕊四个，着生于子房基部，雌蕊一个，子房密生细毛，荚果扁平，状如野豌豆荚。

药用部分及采集时间：夏日采全草入药。

性味：甘，寒，无毒。

效用：清肝明目

方剂：治眼翳不明，夜盲：

1.水皂角粉末二钱，煮猪肝或用蜂糖调服。

2.水皂角烧猪前蹄，先熏后吃，数次即愈。

治鸡蒙眼（夜盲）：水皂角二两煎水服，二、三次痊愈。

治半边头痛：水皂角和头晕药各一两，青鱼胆草五钱，煎水服。

治眼翳：水皂角、夜明砂、木贼、青茺子、地星秀各二钱蒸

鸡肝或羊肝，先熏眼后服药液。（不放盐可加白糖）



水 皂 角

- 1.植物全形； 2.小叶；
3.花； 4.雄蕊和雌蕊。

水 案 板

别名：釘耙七（嫩根名）。

学名及科别：Potamogeton polygonifolius pourr. 是眼子菜科植物眼子菜。

植物形态：为多年蔓生草本，普遍生于水田及沼泽地带。地下茎細柔，横行于水底泥浆中，节上生鬚根，幼苗根部常生七至九个細长幼芽，形略似釘耙，地上茎沉生水中，圓柱形，綠白色，有节，节处略膨大。单叶互生或近于对生，具长柄，叶片有二型；沉水叶和浮水叶，沉水叶質薄，細长呈披針形，浮水叶形大，呈橢圓形，質較厚，光滑无毛，叶面綠色，有光泽，叶背淡褐色，先端略尖，全緣，基部楔形，斜向横出平行脉。夏日，茎梢抽花梗，梗上着生頗多黃綠色小花，排列成穗状花序；花被四片，离生整齐，雄蕊四个，雌蕊四个，离生，果实核果状，卵形。

药用部分及采集时间：药用全草，最好在冬春（即犁田后）采集具有丁扒样的幼芽。

性味：甘，微涩，寒，无毒。

效用：清热解毒止血，治痔疮出血，火眼。

方剂：治痔疮出血：水案板叶和根一两至二两炖猪大腸吃。

治腸风下血（內痔出血）：水案板一两，紅椿根皮五錢，槐角五錢，装入猪直腸中炖吃。

治气痞肚痛：水案板嫩根（干）五錢，切細，加烧酒一两五錢，煨开水服，日服三次，外用蜘蛛香根条一枝（生的）冲烂，貼肚臍一、二日見效。

治火眼：

1. 新鮮水案板叶数张，貼于眼皮上，干后即換。

2. 水案板三錢，蒲公英根三錢，青魚胆草二錢、研末，蒸猪肝二两，內服。

治热淋：水案板（生）二两，煎水去渣，煎甜酒服。

治黃疸病：水案板一两（生），煎水內服。

治常流鼻血：水案板一两，綠壳鴨蛋二个，水案板加水煎汁，汁煮蛋花，一次服用。



水 案 板

1. 植物全形; 2. 花; 3. 雄蕊;
4. 雌蕊; 5. 果实。

水 对 叶 蓮

别名：水泽兰。

学名及科别：Hypericum hakonense, Franch, et sav. 系金絲桃科植物。

植物形态：为多年生草本或亚灌木，多丛生于溪边或沟边。茎直立，四稜形，高約三尺，皮綠色、下部多木化，上部草質，叶腋間多抽枝条。单叶对生，无柄，叶基互相接近，叶片披針形，先端漸尖，全緣，質薄，綠色，并有透明小点，羽状网脉。夏日枝梢开花，呈聚繖花序；花两性，整齐，离生，萼綠色，五瓣；花冠五瓣，倒卵形，黄色；雄蕊多数，雌蕊一枚，子房上位，卵形，柱头五裂。花后結蒴果，內藏多数細小种子。

药用部分及采集时间：夏季采全草入药。

性味：辛、苦、温、无毒。

效用：行血活血，治风湿骨痛，妇女經閉。

方剂：风湿疼痛，跌打损伤：水对叶蓮、白风藤、黑风藤、白金条、大血藤、当归 各三錢，紅花一錢，泡酒一斤，每次服五錢。

治妇女經閉：水对叶蓮 五錢，小血藤三錢，巴岩姜三錢，泡酒半斤，每次服 五錢。

禁忌：孕妇忌服。



水对叶莲

1. 植物全形; 2. 花; 3. 雄蕊; 4. 雌蕊;
5. 果实; 6. 果实横断面; 7. 种子。

水 白 菜

別名：龙爪菜

學名及科別： *Ottelia* sp. 系水荇科植物。

植物形态：为一年水生草本，多生于水沟或池塘中。須根多数，白色柔嫩。叶从根部丛生，长一至二尺，柄长有稜，質松如海綿状，基部寬闊，向上漸狹小，浮在水面的叶大呈广卵形，生在水中的較狹呈长卵形，先端鈍尖，全緣或淺波緣，基部心形或渾圓，紫綠色，質薄而柔軟，网状脉，主脉七至九条，側脉呈弧形，夏日叶丛中抽花梗，长达二尺，上有五至六稜，頂端集生二至四花，外被苞叶二片，花两性，整齐，萼三片离生，綠色，花冠白色，三瓣离生，雄蕊六至十二个，黃色，雌蕊一个，子房下位細长，花后結长角状果实，长约二寸，稍弯曲状如龙爪，內藏多数长橢圓形的种子。

药用部分及采集時間：全草入药，四季均可采收。

性味：甘，淡，微寒，无毒。

效用：除湿化痰，利尿消肿止咳。

方剂：治哮喘：水白菜、水高粱、倒触伞，各五錢，煎水吃。

治水噎肺胀：水白菜二两，通花根二两，鸡屎藤三两炖肉吃。

治肺結核：水白菜一两，子母蓮五錢，炖肉吃。

治湯火伤：水白菜三錢，冰片一錢，各药成末，加麻油調和，外搽伤处。

治飽胀：水白菜、泡通花、柚子壳、辰砂草，晒干等量研粉，每次五分，早上空腹用开水吞服。

治热咳浮腫：

1. 水白菜五錢，百部四錢，煎水服。

2. 水白菜（鮮）二两，烂茶坭（接骨木）鮮嫩叶一两，煮豆腐服。

治水肿：水白菜、石菖蒲、通花根各五錢，煎水服。



水 白 菜

1. 植物全形； 2. 果实尖端；
3. 果实横断面； 4. 种子。

水 慈 菇

别名：剪刀草。

学名及科别：*Sagittaria aginashi makino*. 系泽泻科植物长叶泽泻。

植物形态：为多年生草本，多生于池沼地带和水沟边。须根多，纤细白嫩，颇多透明横纹，中空，数叶从根部丛生，高约一至二尺，柄长，基部膨大，内面具有肉芽四至五个，向上渐渐狭小，质松多空隙如海绵状，叶片箭形，先端锐尖，全缘，绿色，网状脉，主脉背面隆起。夏日叶丛中抽花梗，直立，高约二尺，梗上每节生整齐花三朵，每朵有一绿色苞片，轮状排列，雌雄同株，下部为雌花，上部为雄花，雌花花瓣白色三片，子房多数，离生，雄花形似雌花，雄蕊多数，花后结球形聚合果，小果呈鳞片状，成熟时易脱落。

药用部分及采集时间：春夏采全草入药。

本种与慈菇，野慈菇相似，惟本种无地下球茎。

性味：辛，凉，无毒。

效用：治毒蛇咬伤要药。

方剂：治毒蛇咬伤：水慈菇捣烂敷患处。

治各种疮毒：加乱头发捣烂敷。

治蜂刺伤：水慈菇捣汁揉搽。



水 慈 姑

1. 植物全形； 2. 叶柄基部，示芽；
3. 雄花； 4. 雄蕊。

水 黃 花

別名：括金板（根），

學名及科別：*Euphorbia adenochlora* Morr. et Decne. 系大戟科植物草薺茹。

植物形態：系多年生草本，高約一至二尺，多生于水溪，道旁或山脚靠近水的地方。莖綠色，七、八月間轉紅，圓形，葉互生，几无柄，披針形，全緣。頂端鈍尖，葉面綠色，光滑，羽狀網脈，主脈明顯。二、三月間，頂端五葉輪生，其葉片為長卵形。上分五枝，每枝有黃色卵形葉三片，葉片叢中又生出細梗，開單性小花，有黃色花冠狀的苞片四瓣。蒴果圓形，表面多疣狀凸出物，成熟後直裂。全株含白色乳汁，折斷後白汁即流出。

藥用部分及採集時間：根皮入藥。夏秋間採集。

性味：苦，辛，寒，有毒。

效用：清熱，逐水，利尿。

方劑：治水腫水臌病：

1. 水黃花干燥根皮，微炒為末，加等量蜂蜜，制成蜜丸如豌豆大，每日服一次，每次一粒，空腹服下，重症體實者可服至三粒，水腫消則停服；至多連服七日。體弱者禁服。忌食鹽一百日。
2. 新鮮水黃花根三錢，加水煎湯內服，如下泄過烈，可用冷粥內服止瀉。
3. 新鮮水黃花根五錢，蒸鴨一只，至極爛內服。


治水蠱血蠱：

1. 水黃花一錢，土知母二錢，五谷子根三錢，土大黃二錢，土茯苓三錢，木通二錢，棕樹根二錢，水皂角二錢，煨水服，以酒為引。
2. 新鮮水黃花根三錢，石菖蒲二錢，煎水服。

治疥癩搔痒：水黃花葉晒干為末，用油調敷患處。

禁忌：1. 虛弱者禁服。

2. 服藥期間忌鹽。



图二七 水 黄 花

- 1.花枝； 2.根； 3.总花序；
4.小花序； 5.雄蕊和雌蕊。

水 馬 桑

学名及科別：*Rotala rotundifolia*, Linn. 是千屈菜科植物，


植物形态：为多年生水生草本，高一尺許，野生于水田和沼泽地带。茎下部蔓生，着地部分节节生白嫩纖細的鬚根，上部茎多直立或斜生，分枝較多，皆为綠色或帶淡紅色，肉質，平滑无毛。单叶对生，几无柄，叶片小而形圓或圓心脏形，肥厚多汁，叶面綠色具有蠟样光泽，羽状网脉，除中脉隱約可見外，側脉不易察覺，先端鈍圓，全緣，基部圓形或微心形。夏日茎端抽花梗数条，其上着生很多小花，排列呈近于穗状的总状花序；花被紫色，八片，浅裂，大小各四片，且相互間隔排列，雄蕊四枚，花絲較长，花药底部着生于花絲上，雌蕊一枚，子房膨大成球，上位，柱头头状。

药用部分及采集時間：不分四季采全草入药。

性味：甘，淡，寒，无毒。

方剂：治热咳：水馬桑一两（干）煎水吃。

治水臟病：水馬桑一两，石菖蒲五錢，煎水吃。



水 马 桑

1. 植物全形； 2. 叶； 3. 花； 4. 雌蕊。

水 八 角 蓮

别名：爬岩龙，自来紅，紅八角蓮。

学名及科別：*Begonia pedatifida*, Leveille. 是秋海棠科植物。

植物形态：为多年生宿根草本，多生于山野水沟中。地下根茎紅色，半透明圓柱形，有环节，节間多有叶柄残痕，圓形，中間略凹，全形略似独脚蓮根茎，下面生許多黑褐色鬚根。春末夏初根茎一端萌发嫩芽，芽綠紅色，由数片长卵形鱗叶組成。叶从根茎生，单叶直立，高約一尺，有时有两叶的，叶柄长，圓柱形，肉質，紅色透明，表面有較淡的斑点，但不明显，并疏生細毛，叶片大，肉質，呈掌状心形，多有三至五深裂，每一深裂又分二至三浅裂，先端略尖，边缘鋸齿状，叶面鮮綠色，疏散有較长毛茸，毛茸基部有凸起小点，叶背毛稀少，淡綠色，掌状网脉，主脉三至八条，背面叶脉凸出。

药用部分及采集時間：春夏采根茎入药

性味：甘，平，无毒。

效用：潤肺，止咳、止血。

方剂：治肺癆，咳嗽，吐血：水八角蓮根三錢（鮮的二兩）煎水服。

治夜夢遺精：鮮水八角蓮、夜寒苏、大莧菜，臭牡丹，各五錢，炖肉吃。

治胃痛：水八角蓮一兩，煮甜酒吃。



水八角蓮

水 东 瓜

别名：接骨丹。

植物形态：为落叶灌木或小乔木，高者可达丈许，多野生，荒坡或路旁。地下根粗壮，有分枝，茎直立，圆柱形，分枝繁多，干茎灰绿色，木质，幼枝有节，半木质或草质。单叶互生，叶柄长，有稜线，腹面有沟，基部膨大包着茎，叶片大型掌状鲜绿色，先端尖，边缘不整齐，为锯齿缘。初夏枝稍抽圆锥花序，上生多数淡黄色小花。花后结球形小浆果，果枝下垂，成熟时呈黑紫色。

药用部分及采用时间：根皮入药，四季皆可采收。

性味：涩，微苦，温，无毒。

效用：接骨消肿。

方剂：治跌打损伤：

1.水冬瓜五钱，地蜂子五钱，酸浆草一两，大鹅儿肠五钱，红牛膝五钱，铁筷子五钱，泡酒一斤，每服一两，日服二次。

2.水冬瓜鲜根皮捣烂，用烧酒炒热包伤处。

治跌打后瘀血不散：水冬瓜，牛膝，木瓜，松节（加減酌量），泡酒内服。

治泡肿：

1.水冬瓜根皮一两五钱，毛蜡烛根二两，山萝卜三两，炖排骨淡吃（忌盐）

2.鲜水冬瓜根二两煨水吃。

接骨：

1.鲜水冬瓜根皮，岩冬青枝尖，捣烂敷患处日换一次，约二十天即愈。

2.水冬瓜一两，巴岩姜一两，野葡萄根一两，共捣烂敷伤处。

3.水冬瓜11钱，鲜泽兰一两，巴岩姜五钱，生牛耳大黄一两，赤葛五钱，小血藤五钱，草乌五钱，生姜二两，各药研成细末混合，加适量酒糟拌匀，外包折骨处，两天换药一次。



水 东 瓜

1. 枝条; 2. 根; 3. 果序。

五 皮 风

学名及科别： *Potentilla kleiniana* wight. et Arn. 是蔷薇科植物蛇含。

植物形态：为多年生草本，多生于原野湿地。茎肥壮，多分枝，常卧伏地面生长。生于茎下部的叶，有长柄，并具托叶，为五出掌状复叶，小叶倒卵形，羽状网脉，叶背脉凸出明显，叶面则陷入成槽纹，深绿色，锯齿缘。全体被有白色绒毛。夏日抽花茎，茎上复叶多具三片小叶。叶液及顶端开淡黄色小花，排列呈复聚繖花序，花冠五瓣，雄蕊多数。

药用部分及采集时间：全草入药。夏秋采取，生用或干燥及蜜炙均可。

性味：苦，微寒，无毒。

效用：驱风，清热，解毒，小儿惊风，止咳。

方剂：

治风热咳嗽：

- 1.五皮风，生用一两，干用五钱，煎水吃，每日三次。
- 2.五皮风五钱，车前草五钱，煎汁，加红糖二两，煮豆腐吃。

治百日咳：

- 1.五皮风五钱，生姜三片，煎水服。
- 2.五皮风五钱，排风藤五钱，梅花刺五钱，大山羊五钱煎水服。忌油。
- 3.五皮风三钱，款冬花一钱，蜂蜜五钱，炙后煎水服。
- 4.五皮风，枇杷叶（去毛蜜炙）桑根皮，生姜，煎水服。

治伤风咳嗽：五皮风，排风藤，煎水服。

治麻疹后热咳：五皮风，白蜡花，枇杷花，各三钱。研末加蜂蜜蒸服。

治小儿惊风：

- 1.五皮风四钱，土升麻三钱，辰砂草二钱，银花藤二钱，地瓜根二钱，煎水服。
- 2.五皮风三钱，全虫一个，僵虫一个，硃砂五分。各药研成细末，混合或散剂，开水吞服。



五皮风

天青地白

别名：白头翁。

学名及科别：*Potentilla chinensis* Ser. 是蔷薇科植物萎陵菜。

植物形态：为多年生宿根草本，多野生于荒山向阳处，以及路旁丘陵地带。根圆锥形，分枝少，黑褐色，长三至五寸，最长者可达一尺。根叶着地丛生，为較大型的奇数羽状复叶，有长柄，其基部呈鞘状，且两侧有綠色托叶，小叶一至七对，长椭圆形或披针形，羽状分裂，无柄，先端略尖，叶緣时有反卷，羽状网脉。叶面綠色，叶背灰白色。全体密被毛茸，尤以叶背及基部最多。夏秋間抽花茎，高一至三尺，茎端开多数小花，歧繖花序，花冠黄色，五瓣离生，萼片两輪，外輪为副萼，較萼片細狭，雄蕊多数，着生花托边缘，雌蕊多数。花后結瘦果，卵形，褐色。

药用部分及采集时间：夏秋掘根入药。

性味：涩，苦，寒，无毒。

效用：清热解毒，赤白痢下，风湿疼痛，瘫痪，癰疽。为治痢疾要药。

方剂：

治痢疾：天青地白根 五錢，煎水服，一日三、四次，二、三日即愈。

治久痢不止：天青地白，白木槿花，各五錢，煎水吃。

治赤痢腹痛：天青地白細末 五分，开水吞服，飯前服用。

治风湿麻木瘫痪，筋骨久痛：

1. 天青地白，大风藤，黑风藤，白风藤，白龙鬚，各四錢，蚕沙二錢，泡酒內服。

2. 天青地白，大风藤，五香血藤，兔耳风，各半斤，泡酒連續服用，每日早晚各服一两。

治风瘫：天青地白（鮮）一斤，泡酒二斤，每次服一、二

两。第二次用量同样，另加何首烏一两。（痛，就加指甲花根二两）。

治火瘡：天青地白叶一两，晒干研末，兌二分上梅片，混勻，先用涇茶洗淨疮口后，再撒上。

治疔疮初起：天青地白根一两，煎水服。

治刀伤止血生肌：天青地白叶（干）研末外撒，或鮮根搗烂外敷。

治母猪疯（癲癇）：天青地白根（去心）一两，白矾三錢，加酒浸泡，溫热內服，連发連服，服后再服白矾粉一錢。



天青地白

1. 植物全形；2. 花；3. 瘦果。

天 泡 果

別名：紅姑娘。

學名及科別：Physalis alkekengi L 系茄科植物酸漿。

植物形态：系一年生草本植物，多生于原野。莖直立，圓形，綠色，高約一至二尺，時有分枝，葉互生，綠色，有長柄，葉片廣卵形，邊緣有不整齊鋸齒緣及齒牙緣，先端銳尖，基部楔形，羽狀網脈，葉面脈下陷，葉背凸出。夏日葉腋或莖端抽短花梗，花單生；萼片五裂，綠色，花冠白色或淡黃白色，五裂整齊；雄蕊五枚，花藥常帶紫色；雌蕊一個，子房上位。花後萼膨大成果狀，初呈綠色，成熟後變紅，內藏圓形漿果。種子細小多數。

藥用部分及採集時間：夏秋採全草入藥。

性味：苦，寒，無毒。

效用：清熱，解毒，利尿，消腫。

方劑：利小便：天泡果全草 五錢，煎水服。（治小兒小便不通）。

治尿結石：天泡果 五錢，龍胆 一錢，草藥（紅茯苓） 三錢，香樟根 一錢，生車前草 五錢，煎水服。

治喉炎：天泡果果實研末吹喉部，（天泡果粉 一錢加冰片一分）。

治天蛇頭（指尖痛）：天泡果果實套在指上患處，經一段時間其痛自止。

治黃疸，利小便：天泡果全草，茅草根，五穀根，各 五錢，煎水服。



天 泡 果

1. 植物全形； 2. 花； 3. 果实；
4. 果实纵剖面； 5. 种子。

双 肾 草

学名及科别：*Spirinthes* sp. 是兰科植物双肾草。

植物形态：为多年生草本。野生于荒山坡草丛中。地下有两个卵圆形的块根，一大一小，形略似肾囊，故名肾囊草。块根上面生数条不定根，初夏抽茎高约尺许。圆柱形，草质，且有细稜纹，叶互生，靠近根部的叶呈鳞片状包着茎，上部叶狭长线形。先端锐尖，全缘，基部包着茎，绿色，草质，直走平行脉，顶部叶短小，披针形，鳞状，夏日，顶端开多数小花，排列呈总状花序，每花有苞叶一片，花柄粗大，且有数条稜线，花被二轮共六瓣，皆为绿色或绿白色，外轮三片，皆为卵圆形，内轮上部二片亦为卵圆形，但较小，其他一片则形奇大而长，且分叉。

药用部分及采集时间：夏日（端午节前后）采全草入药。

性味：甘，温，无毒。

效用：补肾壮阳，治走子、疝气、阳萎、睪丸肿痛。

方剂：治走子：

1. 双肾草（鲜）三钱，炖肉吃。

2. 双肾草（鲜）阴桃七个、芭茅果三个，煎水服。

治疝气，缩阴，走子：双肾草一钱，加水煎汤内服，再另取一分用盐炒，包在臍上。

治墜桃、走子：双肾草二钱，櫻桃核二钱，騷羊古二钱，各药研成细末混合，每次两钱用开水吞服。

治墜桃：双肾草二钱，广木香二钱，肉桂二钱，各药研成细末混合，每次一钱用酒吞服。

治疝气子肿：双肾草根五粒，加甜酒煨服，外用葱、姜、艾、香櫟等分，捣烂，酒炒热包之。

治阳萎：双肾草（干）五钱，花蝴蝶三钱蒸瘦肉吃。

治虚寒阳萎：双肾草（干）五钱，爬岩龙五钱，公母丁香各

一錢，芫花一錢，切碎蒸肉吃。

滋補強壯治體虛：雙腎草五錢，何首烏三錢，八月瓜根三錢，加水煎湯內服。

治小兒遺尿：雙腎草（鮮）一兩，炖豬肉半斤或豬膀胱一個，內服。



双 肾 草

1. 植物全形；2. 花的正面观；3. 花的侧面观。

反 背 紅

别名：硃砂草。

学名及科別：唇形科植物。

植物形态：为多年生草本，多生于山坡草丛中或道旁。基部叶略看好似丛生，細看則为对生，叶柄长，基部略膨大，叶片长卵形，波浪緣，頂端略尖，基部心形或截形。叶面浓綠色，叶背紫紅色，故名反背紅，羽状网脉，叶背脉明显凸出，叶片基部有时分裂一至二片小叶。茎和叶柄有細毛。三、四月間抽花茎，高約尺許，茎四楞，紫紅色。茎叶小对生，长卵圓形或披針形，頂端具較长的花穗，小花排列成輪繖花序，每輪有二至六朵小花，唇形花冠，紫紅色，花萼紅紫色，管状三裂，花后宿存內藏四顆小坚果。

药用部分及采集時間：夏日采全草入药。

性味：苦，辛，寒，无毒。

效用：涼血止血活血，为止血的要药。

方剂：治吐血：反背紅三錢，栗寄生，藕节，硃砂蓮各三錢，煎水服。

治吐血及紅崩：反背紅五錢，硃砂蓮三錢，拳參五錢，煎水服。

治鼻血：反背紅、包谷鬚各三錢，煎水服。

刀伤止血：反背紅葉搗烂，包敷患处。

治血痢：反背紅三錢，枣儿紅三錢，紅糖一两，加水两小碗，煎湯一碗，飯前服用。



反 背 紅

1. 植物全形；2. 花；3. 花萼；4. 雄蕊；
5. 雌蕊；6. 果实。

毛 青 杠

别名：紅刺毛藤

学名及科別：*Ardisia villosa* Mez. 是紫金牛科植物毛茎紫金牛。

植物形态：为山野自生常綠小灌木。长一至二尺，茎圓柱形，赤褐色，密被赤褐色絨毛。叶互生，或二至五叶宛如輪生，具短柄，叶片长橢圓形或倒卵形，綠色，叶端略尖，边沿疏生銳鋸齿，并有小刺。基部闊楔形，羽状网脉，叶背脉凸出。叶柄及叶的两面均被赤褐色短毛，夏日茎上生花梗，基部有一小鳞叶、宛如腋生，花梗上生一至三朵小花，呈聚繖花序；花小，淡紅色，两性，具五片披針形离瓣萼，花后結朱紅色漿果，萼片宿存。

药用部分及采集時間：藤入药，四季皆可采收。

性味：苦，辛，溫。


效用：舒筋活血，跌打损伤，风湿腰痛，筋骨疼痛。

方剂：治风湿跌打损伤腰痛：毛青杠五錢，見血飞三錢，大血藤五錢，石南藤五錢，和尚头五錢，刺五甲五錢，茴香根五錢，木通五錢，鉄筷子五錢，老虎麻五錢，硃砂蓮二錢，搜山虎一錢五分，泡酒三斤，每服不超过一两。

治跌打腰痛，筋骨疼痛：毛青杠粉末，用酒吞服，每次服药二、三分。

治跌打旧伤发痛：毛青杠一两，小血藤二錢，泡酒半斤，每次服药酒一两。

治肾虚腰痛：毛青杠一、二錢，炖鸡吃。



毛 青 杠

白 側 耳

学名及科別：Pdrndssid sp.系虎耳草科植物白側耳。

植物形态：多年生草本，全草高約一尺，地下有主根，旁生多数細小白色鬚根。叶从基部丛生，叶片肉質，馬蹄形或卵状心形，叶面深綠色，有光泽，叶背淡綠或綠白色，叶脉微凸出，全緣或有微波，端鈍圓，基部心形，网状脉，中脉兩側各有三至五条弧形主脉。叶柄长，肉質，基部膨大成鞘状，并附生有黑棕色細毛，六、七月間，抽花茎上开白色小花，单生，萼五片綠色，花冠五瓣，倒卵形，下部兩側邊緣呈羽状細裂，雄蕊五个花药肥壮絲极短雌蕊一个卵圆形。

另有一种家白側耳（图三八），系三白草科植物，多为家栽，功用与白側耳同，但效用大，用量小，为民間医所喜用。

药用部分及采集時間：全草入药，四季皆可采收。

性味：辛，甘，溫，无毒。

效用：补肺止咳，治妇女白帶，跌打損伤。

方剂：治虛弱久咳：白側耳二两，煨猪肉吃。

治肺結核咳嗽：白側耳粉末一錢，蒸鸡蛋吃，每日一次，連吃七天。

治妇女白帶：白側耳二两，白木槿花五錢，炖猪肉或煎水服。

跌打損伤：家白側耳根一两，五虎下西川三錢，泡酒半斤，每服药酒五錢。



白側耳

1. 植物全形；2. 花瓣；3. 雄蕊（示正面和背面）；
4. 雌蕊。



家白側耳

白 頂 草

別名：白口瘡葯，仆地菊。

學名及科別：菊科植物。

植物形態：為多年生草本，高約一尺，原野、路旁處處都有。地下生鬚根，全株密被細毛，莖單一或數莖從根生出，直立，有節，綠色。根葉叢生，莖葉對生，無柄，葉片綠色，均為匙形或倒卵狀披針形，先端鈍，鋸齒緣或齒牙緣，基部兩側多呈小耳狀包着莖，羽狀網脈。春夏間頂端或葉腋抽出總狀花序，上生多數小形頭狀花，每個頭狀花，具有總苞，苞片數層，綠色，細小卵形，花序乍看為白色，細看則外圍是白色小花，中央則為黃色管狀花。花後結細小瘦果，無冠毛。

葯用部分及採集時間：全草入葯，四季均可採收。

性味：辛、涼，無毒。

效用：治白口瘡。

方劑：治白口瘡：鮮白頂草搗爛，兌二道淘米水，用青布蘸洗，二、三次見效。

治喉蛾及白口瘡：鮮白頂草搗碎，兌淘米水洗口後用山荊末撒上。

治瘰癧：鮮白頂草揉碎搽患處，數次可愈。



白頂草

1. 植物全形；2. 花序邊緣的白頂花；3. 黃色管狀花；4. 苞片。

仙 桃 草

别名：蟠桃草，无风自动草，接骨仙桃。

学名及科别：veronica peregrina Z. 玄参科植物蚊母草。

植物形态：为一年生草本，多生于麦田中。鬚根，基部茎节也生多数鬚状不定根。茎直立，高二至五寸，圓形，多分枝，叶大多是对生，几无柄或有短柄，叶片长橢圓形或长卵形，淡綠色或淡紅色，肉質，有疏鋸齒緣，叶端鈍尖，基部楔形，羽状网脉。春日叶腋及茎頂开极小的白花；花冠四片，离生；萼片較花冠狭且长，綠色；雄蕊不明显，雌蕊一个，子房膨大，多数子房在未成熟时，被幼虫寄生而形成虫癭，其状如桃，故名仙桃草。每个虫癭中有一小虫，白色肥壮，形似小蛆，成虫后长翅，且咬破虫癭飞出，由于有虫在內，虽无风，草亦常摆动，故又名无风自动草。未被虫寄生之花，成熟后結小果，呈扁的倒心脏形，成熟时頂端开裂，內藏多数細小扁圓形种子。

药用部分及采集時間：春末采全草入药，以虫癭多且未破的为最好。采后应立即在甑內蒸十多分鐘，把虫杀死，干燥备用。

若无虫癭或虫已飞走的，效力就差。

性味：甘，溫，无毒。

效用：止血活血，續伤接骨，补血調經。

方剂：治跌打损伤：

1. 仙桃草四兩，熬酒服，渣包伤处；或粉末二錢，用酒吞服。
2. 仙桃草，研粉調冰片撒于伤口上，可止血。
3. 仙桃草四錢，骨碎补二錢，煎水服。

接骨：仙桃草（干）二兩，煎水服，骨折处用布端正包紮，約五周就能行动。

治咯血，伤后咯血：仙桃草末一錢，开水吞服。

补血：

1. 仙桃草末三錢，蒸鸡肝或猪肝吃。

2. 仙桃草，头晕药，各三錢，炖肉煮鸡蛋服。

3. 仙桃草二錢，用油盐湯吞服。

治月經不調痛經：仙桃草三至五錢，兌甜酒吃。

治舌下核肿：仙桃草末，每服二錢。

禁忌：孕妇忌服。



仙桃草

1. 植物全形; 2. 花; 3. 雌蕊; 4. 果实;
5. 虫囊; 6. 虫囊剖开示幼虫; 7. 成虫。

对 叶 蓮

别名：一枝香，竹叶細辛。

学名及科別：*Pycnostelma paniculatum* (Bunge) Schum. 是蘿藦科植物徐长卿。

植物形态：为多年生宿根草本。地下有多数較粗的鬚根，形似細辛。茎圓柱形，纖細直立，下部較坚硬，表面有細稜紋。叶对生，几无柄或有短柄，长披針形，先端漸尖全緣，时有反卷，羽状网脉，叶面主脉下陷，叶背凸出，側脉不明显。叶面綠色，叶背淺綠色，全体平滑无毛。夏日茎端或叶腋抽細花梗，上生小圓錐花序；花两性，淡綠色，萼片五瓣細小，深裂，花冠較大，五瓣深裂，裂片广卵形，內面还有副冠，五瓣一輪，肉質，雄蕊五个联合，雌蕊位于其中。蓇葖果呈角状，成熟时腹部开裂，內藏具有銀白色冠毛的种子多粒。

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。

性味：辛，香，溫，无毒。

效用：补气补血，行血活血，为治月經不調要药。

方剂：治气虛血虛：对叶蓮 五錢，炖肉吃。

治盜汗：对叶蓮干末 一錢，盐水冲服，日服二次，連服三日。

治肺热、盜汗、咳嗽：对叶蓮 二錢，鹿含草 二錢，研成細末，混合成散剂，兌汽水或蒸肉，一次服用，連用三剂。

治月經不調：

1. 对叶蓮 五錢，泡酒 四兩，每服药酒五錢至一两。

2. 对叶蓮 一两，月季花根 二兩，五香血藤 五錢，大血藤 八錢，岩川芎 一两，穿心蓮 四錢，泡酒常服。

治血虛經閉：对叶蓮 二、三錢燉甜酒內服或炖肉吃；或研末吞服一錢。

治經期腹痛：对叶蓮根 三錢，月月紅 二錢，川芎 一錢，切

細，泡酒四兩，內服。

治經期腹痛，腰腿痠脹：對葉蓮根 三錢、鐵筷子、香樟根、小血藤、大血藤、牛膝、伸筋草，各一錢，浸酒半斤，每用七錢至一兩，飯前溫服。

治月經過多：對葉蓮 二錢，馬蹄草 二錢，月月紅 二錢，硃砂蓮 二錢，海螵蛸 一錢，共為末，每用酒吞服一錢。



对 叶 莲

- | | |
|----------|----------|
| 1. 植物全形; | 2. 根和茎基; |
| 3. 花; | 4. 果实。 |

对 叶 四 块 瓦

别名：四叶細辛，四大金刚，四块瓦。

学名及科別：Chloranthus Serratus Roem et schult. 是金粟兰科植物及己。

植物形态：为多年生草本，野生于山野林間潮湿处。地下有根状茎，上生多数鬚根。地上茎圓柱形，直立，綠紫色，有节，下部节間长，上部节間短，节处略膨大。叶对生，往往只有四片叶聚生茎頂故名对叶四块瓦。具短柄，叶片橢圓形，叶端尖或銳尖，鋸齒緣，基部楔形，叶面深綠色，叶背略淡，羽状网脉，叶背脉凸出。夏口茎端抽穗状花序，单梗或二至三梗，上生多数白色小花；无花被；雄蕊肉質，形如屈指掌状，腹部藏花药二个，雌蕊子房上位，浆果小，梨形，全体光滑无毛。

药用部分及采集时间：全草入药，春夏采集。

性味：辛，溫，无毒。

效用：祛风除湿，舒筋活血，跌打损伤。

方剂：驅风开窍：对叶四块瓦 五錢，搗烂冲米泔水吞服。

通經：对叶四块瓦 三錢，蒸酒 四兩，每次服酒五錢至一两（体好的服一两，体弱的服五錢）。

治虛弱：对叶四块瓦根 三錢，炖鸡吃，病重者五、六次，輕者三次。

治风湿，跌打损伤：对叶四块瓦 一两，泡酒半斤，每服药酒五錢至一两，药酒外搽亦可。



对叶四块瓦

1. 植物全形； 2. 花序一部分； 3. 花（正面观）。

玉 枇 杷

别名：白脉者称玉枇杷，黄脉者称金枇杷。

学名及科别：菊科植物。

植物形态：为多年生常绿草本，多为家种。地下根肉质肥壮，常見茎的残痕，其上生多数鬚根，茎直立，肥壮肉质，高三至四尺，上部略扭曲，微现四稜形，下部圆柱形，表面常有叶基残痕，其横断面周围可见白色斑点，环状排列。单叶互生，柄短，基部膨大，叶片大，长达尺许，广卵形或广椭圆形，先端钝尖，边缘有粗锯齿，基部楔形。叶面碧绿色，叶背灰绿色，肥厚肉质。羽状网脉，主脉粗大，白色肉质，边缘处支脉相互连接。

药用部分及采集时间：根或叶入药，四季均可采用。

性味：涩，微辛，温，无毒。

效用：跌打损伤接骨。

方剂：治因伤溃烂，生玉枇杷叶捣烂敷上，敷一次洗一次。坏肉落完时，再用玉枇杷叶研末，每两兑冰片一钱，撒上。
(另服药调治)

接骨：

1.玉枇杷根叶捣烂加甜酒糟包患处。

2.玉枇杷，巴岩姜，野葡萄根，泽兰，捣烂包患处。

治跌打损伤：玉枇杷五钱，红牛膝五钱，巴岩姜五钱，花蝴蝶五钱，泡酒半斤，每服一两。



玉 枇 杷

1. 枝条; 2. 根和茎基。

母 猪 藤

学名及科别：*Cissus japonica* willd 系葡萄科植物烏蘼莓。

植物形态：为多年生草質藤本，长约二至三尺，原野自生。地下有根茎，蔓延繁殖，全身密被細毛；地上茎纖細，柔軟，有稜綫，蔓生或攀緣他物上升。节上与叶对生处生有叉状卷鬚，叶互生，柄长，茎部膨大，掌状复叶，小叶多为五张，少有三张，中央一片較长大，有柄，卵圓形或橢圓形，先端尖或銳尖，粗鋸齒緣，綠色，羽状网脉，夏日抽繖房状聚繖形花序，与叶对生或假腋生，萼四裂，綠色，膜質，花瓣四片，淡黃綠色，雄蕊四枚，花后結卵形漿果，內藏二至四粒种子。

药用部分及采集时间：根入药，四季均可采收。

性味：苦，辛，平，无毒。

效用：治风湿瘫痪，母猪疯。

方剂：治母猪疯：母猪藤根节为細末，发病前一、二日服。每服一錢用酒吞。

治风湿瘫痪，行走不便：母猪藤一两五錢，大山羊一两，大风藤一两，泡酒一斤，每服五錢至一两，日服二次，經常服用。



母猪藤

1. 植物全形； 2. 花； 3. 果实；
4. 果实横断面； 5. 种子。

头 暈 藥

别名：南布正。

学名及科别：*Geum japonicum* Thunb. 是蔷薇科植物水楊梅。

植物形态：为多年生草本，多生于山阴地带及路旁潤湿处或水沟边。地下鬚根很多，但年老的根丛中往往有一短而大的根茎。根叶着地丛生，形略似菜菔叶，羽状复叶，具长柄和明显的托叶，小叶大小頗不一致，粗鋸齿緣或缺刻，基部楔形，羽状网脉，叶面綠色，背面略淡。全株密被白色茸毛。三、四月間抽茎，高約二至三尺，茎叶为互生，单叶，羽状或掌状网脉，边緣多缺刻。夏日茎頂或叶腋抽花枝，每枝頂端生一花，萼两层交互排列，外层小，內层較大，卵圓形，花冠薔薇形，黃色，五瓣，雌雄蕊均为多数。果实細长，先端有弯曲小鈎，多数聚集呈球状。

藥用部分及采集時間：夏秋采全草入藥，用根更佳。

性味：辛，香，溫，无毒。

效用：舒肝解郁，头昏目眩，为补虛弱，治头昏的要藥。

方剂：治头暈：头暈藥一两五錢，炖猪肉或蒸肉，蒸田鸡，或煎水煮綠壳鴨蛋吃。

治老年头暈：头暈藥二两炖猪肉，肉湯煮綠壳鴨蛋吃。

治头暈疼痛：头暈藥一两，仙桃草一两，研末，肉湯或油湯送下，每服五錢。

治虛弱，精神不振，骨蒸自汗：头暈藥三錢，地骨皮三錢，臭牡丹根三錢，蒸子鸡一只內服。

治虛弱咳嗽：头暈藥、老虎姜（黃精）、竹叶黃、夜寒苏、白胭脂花根、川牛膝、姜各三錢煎水服。

治腎亏体弱阳萎：头暈藥二两，五谷根四两，枸杞二两，肉桂五錢，黃精五錢，猪腎五个，用細火煮約二小时，日服五次，三日服完后，并将猪腎全部吃下。

治痢疾腹痛：头晕药根五钱，炒红糖，煎水服。

治风寒感冒：头晕药根三个，煎水内服。



头晕药

地 蜂 子

別名：鉄紐子。

学名及科別： *Potentilla nivea* L. 是薔薇科植物白里金梅。

植物形态：为多年生宿根草本。高約五至八寸，根叶丛生，有长柄，叶柄基部稍膨大，呈鞘状，上有小托叶；叶为三出掌状复叶，小叶倒卵形或卵圓形，鋸齒緣，羽状网脉，复面略凹，背面略凸，叶面深綠色，叶背淡綠白色。全株密被白色絨毛。春夏間抽茎，茎叶互生，亦为三出掌状复叶。頂端开数朵花，柄长，花冠黃色，五瓣离生，薔薇形。花萼两层，外层萼片細小，呈披針形，基部联合，內层萼片較大，呈长卵形，着生于花托上，均为淡綠色，雄蕊雌蕊均为多数，离生，皆着生于花托上，花后結成多数瘦果聚合成的聚合果。地下根茎短，拇指大，卵圓形，有鬚状支根。

药用部分及采集時間：夏秋掘其根茎入药。

性味：酸，溫，无毒。

效用：肺虛咳嗽喘息，为跌打损伤要药，并治疯狗咬伤，腹泄痢疾。

方剂：治虛弱咳嗽盜汗：地蜂子末一錢至一錢五分，蒸肉或蒸鸡蛋吃；并有壯阳之效。

治咳嗽：地蜂子七个，蒸烧酒內服。出汗后，再用观音草，野青菜，头晕药，炖鸡吃。

治喘息：地蜂子五錢煎甜酒吃，或粉末一錢开水吞服。

治跌打损伤：地蜂子末一錢至一錢五分，用酒吞服。

治血痢：地蜂子十个，蒸甜酒吃。

治疯狗咬伤：地蜂子五粒，白楊树根皮二錢，化槁树皮二錢，煎水服，能預防狂犬病（疯狗伤发）。伤后一星期內服之有效。



地 蜂 子

地 米 参


学名及科别：*Pedicularis* sp. 是玄参科与盐灶菊同属的植物。

植物形态：为多年生宿根草本，野生于湿润山坡草丛中。地下有多数白色粗短的肉質根，地上茎多分枝，綠色，草質，长一至二尺。叶互生，有的近于对生，几无柄或有短柄，叶片深綠色，橢圓形或卵状披針形，羽状半裂或深裂，鈍头，基部截形或心形，羽状网脉，夏日，枝梢及茎上部叶腋間生花，排列呈总状花序，花有柄，萼筒形，綠色，宿存，密被絨毛，有一深裂口，上端六裂，裂片呈头状。花冠唇形，紫紅色，頗美丽，上唇弯曲，端尖，状如鷹嘴，并掩盖着雄蕊和雌蕊，下唇寬闊而圓，三浅裂，雄蕊四个，二强二弱，花枝密被細毛，花药背着，雌蕊一个，子房上位，卵圓形，花柱細长，并多伸出花面，柱头头状，花后結蒴果。

药用部分及采集时间：夏秋采块根入药。

性味：甘，微苦，平。

方剂：补血，調經，止虛汗：地米参五錢，炖肉吃。



地米参

1. 植物全形; 2. 花; 3. 花萼;
4. 雄蕊; 5. 雌蕊。

地 核 桃

別名：小种馬蹄細辛。

学名及科別：*Viola nipponica* Maxim. 系堇菜科植物， 堇 堇。

植物形态：为多年生草本，高約五寸，全身密被細柔毛，地下有根茎，上生多数鬚根，叶着地丛生，有长柄，肉質，叶片卵圓形，綠色，先端鈍尖，細鋸齒緣，基部心脏形，网脉，近于掌状。早春叶丛中抽花梗，花单生，花柄长而細柔，多下垂，梗上有披針形小苞叶二片：萼綠色，鈍头，全緣，密被細毛，宿存。花瓣淡紫色，五片离生，不整齐，腹面密被細毛，花瓣基部伴有短距。果实为蒴果，状似核桃故名地核桃。成熟时三瓣直裂，內藏多数种子。种子卵形，白色光滑，一端有淡黄色肉質种阜，腹部有明显的种脊綫。

药用部分及采集时间：本种多生于树阴下或道旁，全草入药，春夏采收。


性味：辛，苦，平。

效用：鎮痛，清热，外敷疮毒。

方剂：治疗疮：鮮地核桃一把，搗烂敷患处；另用二两煮水內服。

治跌打伤痛：地核桃、鉄筷子、見血飞、大血藤、泽兰根各三錢，泡酒服。

治食滯胃痛：地核桃根三錢煎水，煮肉丸子湯內服。



地 核 桃

1. 植物全形； 2. 果实； 3. 种子。

地 星 宿

別名：滿天星，明鏡草，星宿草。

學名及科別：*Hydrocotyle rotundifolia* Roxb. 是繖形科植物天胡荽。

植物形態：為多年生雜草，庭院及路旁濕潤地帶，到處都有蔓生。莖細柔，圓形，綠色，有節和細稜，全長約五寸至尺許，匍伏於地面生長。葉互生，有長柄，葉柄基部兩側有鞘狀托葉，葉片圓心形，掌狀淺裂，葉面深綠色，有光澤，葉背綠色，掌狀網脈。春夏間，葉腋抽花梗，上生多數小花，有短柄，排列呈球狀繖形花序；花冠小，白色，五片。果實為雙懸果。

藥用部分及採集時間：全草入藥，四季皆可採收。

性味：辛，苦，微寒，無毒。

效用：清肝熱，療黃疸，明目，清熱利尿，治小兒疳積。

方劑：

治小兒疳積：

- 1.地星宿五錢至一兩，蒸雞肝或豬肝吃。
- 2.地星宿三錢，斑鳩窩一錢五分，蒸雞肝吃三次，亦可加白糖與雞肝沖爛蒸吃。

治小便不通：

- 1.鮮地星宿一兩（小孩酌減），搗爛擠水，加白糖一兩服，或煎水兌白糖服。
- 2.地星宿二兩（干的五錢），姜開水為引，內服。

治紅淋症：地星宿、扁蓄，各四兩，搗爛取汁兌白糖服。

治濕熱口渴，小便不利，眼黃：地星宿一握，搗汁一茶杯吞服。

治肝炎發黃：鮮地星宿五錢至八錢（干的三錢至五錢），茵陳蒿五錢，煎水吃，日服三次。

治热重咯血：鮮地星宿一两，搗烂取汁，白糖五錢，冲溫开水服。

治火眼生翳：

1.地星宿二两，蒸猪肝或鸡肝吃，可先薰眼再吃。

2.鮮地星宿搓烂塞鼻孔，左目塞右鼻孔，右目塞左鼻孔。

治夜盲：地星宿洗淨蒸猪肝（或羊肝）服。

治齿縫出血：鮮地星宿一握，用冷开水洗淨，搗烂浸醋，含在口中五分鐘后吐出，日含三、四次。

治牙痛：地星宿搗烂調菜油敷面頰牙痛处。

治喉头炎：地星秀一两，煎水服。

治鼻蠱：地星宿五錢，生鸡蛋一个，醋一小碗，共装沙罐內，用鼻常嗅，多次有效。

治蛇纏腰（腰围湿疹）：鮮地星宿一握，洗淨搗烂，絞汁一杯，加雄黄末一錢，用洗淨的鸡毛或鴨毛，蘸药液抹患处，日敷两次。

治小儿湿疹流黄水奇痒：地星宿叶粉末，調芝麻油搽。

治蛔虫病：地星宿切細調鸡蛋用油煎服。

治腎囊风：地星宿一两，白礬三錢，同搗，搽患处。



地 星

1. 植物全形; 2. 叶; 3. 花; 4. 果实。

血 人 参

学名及科别： *Lespedeza Buergeri* Miq. 系豆科植物綠叶胡枝子。

植物形态：为落叶亚灌木，野生于山地。根粗大，木質，横断面血紅色。全身密被細柔的白色短毛，老茎木質，上部草質，具五稜。叶互生，三出复叶，有长柄，叶柄两旁有細小托叶，小叶倒卵形或倒卵状橢圓形，先端有細小短尖，稀有微凹，全緣，叶面綠色，叶背灰綠色，羽状网脉。夏秋間，叶腋抽穗状的总状花序，花梗有互生的小节，每节集生小花二朵，每朵花具一卵形小苞片，萼綠色有毛五裂，蝶形花冠，紫紅色。花后結矩形莢果。

药用部分及采集时间：根部入药，用时去粗皮，四季均可采收。

性味：涩，微苦，平无毒，（煮熟味香甜）。

效用：补血活血。

方剂：治虛弱咳嗽血气凝滯癥瘕：血人参二两用鸡或鴨或猪肉炖服（以炖鸡最好，肉次之）。若为热咳，則先用鴨炖第一剂；若涼咳，則加生姜二两为引，以半夜叫醒服用，效用特別显著。每間十日一剂，病重者可用至七八次，服后有微汗，一、二日开始显效。

本方可配合何首烏治淋症，并先服本剂。

治紅淋白浊：血人参二两，牛耳大黃五錢，牛膝五錢，煎水后，以鯽魚四两，割开不洗，用姜二錢，葱一錢，醋四至五錢煎湯服。

治阴虛腎亏精神不振：新鮮血人参根一两（干品用五錢）炖猪肉一斤，将猪肉及湯服下，每三日服用一剂，連用三剂，



血人參

- 1.花枝； 2.根； 3.花；
4.花序一部分，示一节集生二朵花； 5.果实。

竹 叶 菜

别名：竹节菜，翠蝴蝶，竹叶兰。

学名及科别：Commelina Communis Linn. 是鴨跖草科植物鴨跖草。

植物形态：为一年生草本，长约一至二尺，野生于山坡道旁和水沟边。地下长鬚根，茎圆柱形，带肉质，绿色，直立或匍伏地上生长，多有分枝，有节，节稍膨大，靠近地面之节常生鬚根，茎的表面有縱行細稜紋，其上疏生柔毛，叶互生，叶柄稍大，呈鞘状包着茎，叶片披针形或椭圆形，先端尖或銳尖，全緣，叶面綠色，叶背淡綠色，直走平行脉。夏日，茎稍开花，单生或二至三朵聚生一起，花由叶状苞片所包围，苞片大，綠色，心状卵形，折合，先端尖，全緣，基部圓形，平滑无毛，背后脉突出，花被六片，二輪排列，外輪三片，綠白色，状似萼，內輪三片，其中二片蓝紫色，形如花冠，其他一片則形較小，白色，雄蕊六个，三个退化，花絲淡蓝色花药黄色十字形，其他三个花絲均长，尤以下側二个最长，花药底着，余下一个药呈“个”字着生，雌蕊一个，子房上位，花柱細长，柱头头状，花后結蒴果，椭圆形，內藏四粒种子。

药用部分及采集时间：全草入药，夏秋季采收。

性味：苦，寒，无毒。

效用：清热解毒，治热痢，小儿丹毒，外敷治关节肿痛。

方剂：治风閉热高烧：竹叶菜、头晕药、魚鳅串各五錢，煎水服。

治吐血：竹叶菜，搗汁內服。

治热痢：竹叶菜一两，煮水內服。

治小儿丹毒：竹叶菜五錢，煮甜酒水內服。

治膝关节肿痛：竹叶菜，搗烂炒热，用酒噴后，敷膝盖上。



竹叶菜

1. 植物全形； 2. 花； 3. 外列后方的萼片； 4. 内列前方的一花瓣；
 5. 外列前方的萼片； 6. 退化雄蕊； 7. 发育雄蕊的二种形态；
 8. 子房的横断面； 9. 果实。

百 尾 笋

别名：白薇（本地当白薇应用，常见的有两个品种）

学名及科别：1. *Disporum putlum* Salisb. 是百合科植物万寿竹。

2. *Disporum sessile* Don. 是百合科植物宝鐸草。

植物形态：

1. 为多年生草本，高約二至三尺，自生于山林阴向处，地下有头状根茎，上生很多白色較大的肥嫩鬚根；地上茎直立，圓形有节，上有披針形膜質叶包着，茎上部多分枝，表面深綠色，且有黑色斑点，叶互生，卵圓形或长卵圓形，深綠色，平滑无毛，有短柄或几无柄，先端漸尖，全緣，基部圓形或微凹，直走平行脉。夏日，枝頂叶腋間抽一至四个花梗，每一梗上生一花；花綠白色或淡黃綠色，两性，整齐，花被六片二輪排列，雄蕊六枚，雌蕊一个，子房上位，有細长花柱，柱头二裂，花后結漿果。

2. 形态与万寿竹相似，但花多为一至二朵集生；而万寿竹多为二至四朵，叶基形度亦有区别。

药用部分及采集时间：夏秋采根茎及根入药。

性味：甘平、无毒。

效用：潤肺止咳止血。

方剂：潤肺补气：百尾笋五錢，炖肉吃。

治咳嗽痰中帶血：百尾笋五錢，蒸冰糖服。

治病后体虛遺尿：百尾笋一两，岩白菜一两，大莧菜一两，炖肉吃。

接骨：百尾笋，水冬瓜，野葡萄根，泽兰加酒，共搗烂，包伤处。



万 寿 竹

1. 植物全形, 2. 根和根茎, 3. 果实。



宝鐸草

1.花枝; 2.果实。

团 經 葯

別名：退骨草

學名及科別：Glechoma hederacea L. 是唇形科植物連錢草。

植物形态：為多年生蔓生草本，生于原野路旁。莖綠色方形，長一至二尺，匍伏或直立。葉對生，具長柄；葉片圓形，鈍鋸齒緣，基部心臟形，掌狀網脈，葉背脈凸出，葉面則下陷。全體密被細毛。春末，葉腋開花；萼片管狀五裂，綠色，花冠唇形，淡紫色，上唇兩裂，下唇為三裂，雄蕊四枚，二長二短，雌蕊一枚，子房上位。花后結小堅果，內藏四粒細小種子。

葯用部分及採集時間：四、五月間採全草入葯。

性味：辛，甘平，無毒。

效用：月經不調，紅崩帶下，解熱利尿，鎮咳，治肺結核。

方劑：治婦科白帶：

1. 团經葯二兩，杜仲二兩、益母草五錢、知母五錢、紅牛膝一兩、木通五錢、加白糖半斤、煎水服三次。
2. 团經葯一兩、杜仲三錢，紅糖一兩，煎水服。
3. 团經葯五錢，杜仲三錢，木通一錢五分、煎水加白糖服。
4. 团經葯四錢，煎甜酒服二、三次。

治月經不調：

1. 团經葯一兩，酒水各半，蒸服。
2. 团經葯三錢，木通二錢，益母草二錢，小血藤二錢，順經草三錢，杜仲三錢，紅花一錢，紅糖一兩，蒸酒，分五次服完。

治月經不調小腹作脹：团經葯三錢，對葉蓮三錢，大葉艾二錢，泡酒吃。

治胎咳，子腫：

团經葯、尖惊葯，大莧菜，花蝴蝶，各三至五錢，炖肉吃或炖鸡吃。

治瘡疾：

团經葯搓成团，塞两鼻孔。

治伤风咳嗽，膀胱炎症，石淋和砂淋：

取鮮团經葯全草五至八錢（干的三至五錢），洗淨后酌加开水，和半两冰糖，炖一小时，伤风咳嗽飯后服；膀胱炎症石淋砂淋症飯前服，日服两次。

治风湿关节炎：

团經葯捶絨酒炒热，外敷。



团經葯

过江龙

学名及科别：Menyanthes trifoliata L. 系龙胆科植物睡菜。

植物形态：为多年生草本，多群生于沼泽和水沟边。全体平滑无毛。地下根茎黄白色，横走泥中，长可达数米，肥壮有节，节上往往被复枯叶，并生有鬚根。叶互生或根生，三出复叶，叶柄长，约尺余，肉质，基部宽阔呈鞘状，半包着茎，向上渐渐变细，而成圆柱形，小叶片几无柄，椭圆形，锯齿缘，齿端有黄白色斑点；肉质，绿色。六、七月间，根叶的侧旁抽花梗；梗端生多数小花，排列呈总状花序，每一花有一披针形苞片，花两性，整齐，萼绿色，五深裂，花瓣白色，五裂，内侧密被白色长毛；雄蕊五个，花药呈黑色，雌蕊一个，子房上位，球形，花柱细长，伸出花被外，柱头三裂，花后结圆形蒴果，内藏十数粒种子。

药用部分及采集时间：根茎入药，四季均可采收。

性味：甘，微苦，平，无毒。

效用：润肺，止咳消肿。

方剂：润肺止咳：鲜过江龙一两（干的五钱）炖肉吃或煎水吃。

消湿肿，治风湿痛：过江龙、通花根五钱（干的）煎水吃。



过江龙

1. 植物全形, 2. 花, 3. 蕊雌。

羊 屎 条

别名：灰猫条。

学名及科别：*Viburnum utile*, Hemsley. 系忍冬科植物。

植物形态：为多年生灌木，多生于荒山坡及路旁。全身密被白色短毛，茎高三至五尺，圆柱形，有节，分枝繁多，幼枝多成绿色。单叶对生，有短柄，叶片椭圆形，先端钝圆或钝尖，全缘，质软，叶面深绿色，叶背灰白色，初夏，茎顶抽繖房状聚繖花序，花小白色。花后结红色浆果，椭圆形，颇美丽，熟后干燥呈黑色。

药用部分及采集时间：根叶入药，随时可采。

性味：酸，涩，平，无毒。

效用：治痔疮，脱肛，热痢。

方剂：痔疮脱肛：羊屎条根二两，炖猪大肠吃。

接骨：羊屎条叶，水冬瓜根皮，小种三七，打末调苦浓茶外涂。

热痢：羊屎条一两，大木姜子七粒，煎水服。



羊屎条

尖 惊 药

别名：辣叶青药。

学名及科别：*Dicliptera erinita* Nees. 是爵床科植物九头狮子草。

植物形态：为多年生草本，野生于山林中。高约一至二尺，茎直立，圆柱形，有节。叶对生，具短柄或无柄，叶片椭圆形或长卵形，端尖，全缘，基部楔形，深绿色，纸质，羽状网脉。夏日，多数叶腋抽短枝，枝端单生一花，有大形叶状苞片两个。花两性，萼绿色，五裂，花瓣紫红色，状如唇形，下部合成细管状，雄蕊二个，生于花冠上，雌蕊一个，子房上位，花柱细长，柱头二裂，蒴果。

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。

性味：辛，凉，无毒。

效用：祛风，清热，定惊，治小儿惊风。


方剂：治小儿惊风或热风：尖惊药干末五分至二钱，开水吞服。

治小儿惊风：尖惊药二钱，白风藤二钱，金钩藤二钱，防风一钱，硃砂二分，麝香五厘；将硃砂与麝香置于盃中，另将前四味药熬水，药水混合硃砂麝香，三次服完。

治小儿吐奶并泄青：尖惊药五钱，根叶并用，煎水服。

治男子尿结：尖惊药、黑竹根、大种鹅儿肠、木通、淮知母，各五钱，加酒十二两蒸，早晚各服二两。第二次用半斤酒蒸，第三次用六两酒蒸。

治痔疮：尖惊药二两，本地槐树根二两，折耳根二两，炖猪大肠（肛口那一节），吃五次。



尖 惊 药

1. 植物全形； 2. 花； 3. 雄蕊； 4. 雌蕊。

见 风 青

别名：羊九，狗脚迹。

学名及科别：*Anemone dichotoma* L. 是毛茛科植物草玉梅。

植物形态：为多年生草本，野生于山坡草丛中和土坎上。地下根粗大圆形，长而直，初春叶从根部丛生，展布地面，具长柄，叶片深绿色，多呈三出复叶状深裂，每一裂又分三浅裂或半裂，裂片倒卵形或倒披针形，先端尖，有缺刻状齿缘，羽状网脉，初夏抽茎高二至五尺。茎生叶与根生叶同，但无柄，且基部包着茎。夏日，茎梢抽生数条花梗，每花梗顶端着生一花；萼五片，绿色，花瓣五片，白色，整齐，雄蕊多数花药底着，雌蕊多数，离生，子房卵形或椭圆形，花柱顶端卷曲呈钩状，花后结聚合瘦果。

药用部分及采集时间：根部入药，夏秋季采集。

性味：苦平，有小毒。

效用：平虚热，解热毒，治瘡疾，咳嗽，风湿痛，外包治疮肿。

方剂：体虚、盗汗、咳嗽：见风青五钱，襄荷根五钱，炖猪肉四两，内服，连用三剂。

治瘡疾：见风青根一两捣烂（忌刀切），冲二次淘米水调匀澄清后，倾上层药液，于发病前二小时服（捣烂后包寸口亦可）。

治顿咳：见风青一两五钱，煮鸡蛋兑蜂糖内服。

治风湿痛：见风青五钱，加酒煎服。

治失眠：见风青一两五钱，菊花根五钱，炖肉吃。

治毒疮：见风青根捣烂敷患处。



見 風 青

1. 植物全形； 2. 花； 3. 雄蕊； 4. 果序； 5. 果实。

见 血 飞

别名：血見愁、黃椒。

学名及科別：是芸香科植物。

植物形态：为落叶大灌木，高可达丈余，枝叶茂盛，树干及枝密生倒钩状短刺。叶互生三出复叶或二叶聚生，具长柄，小叶长椭圆形或长卵形，几无柄，革质，光滑无毛，先端渐尖，基部楔形，边缘有微波或全缘，羽状网脉，主脉明显，两面突出，支脉不显，叶面黄绿色，隐约可见许多点状油室，叶背绿白色，支脉清晰可见。夏日叶腋抽花梗，上生多数小花，聚成总状形的复繖形花序。花后结小，桔果，扁球形，干后呈黑褐色，果皮上有颇多小点（油室），且有芳香。

药用部分及采集时间：根部入药，四季皆可采收。

性味：辛，苦，温，无毒。

效用：行血，活血，止血，生肌。

方剂：治跌打损伤：见血飞三钱，月月红根二钱，牛夕三钱，共研末用酒为引（如为头部损伤，加羌活二钱，藁本二钱）。

治跌打损伤有瘀血：见血飞一两，煮酒服。

治刀伤止血生肌：见血飞根皮（去粗皮部分）研成粉末，撒于伤口上。

治大吐血：见血飞五钱，地柏枝五钱，烧纸半张，混合，开水吞服。

止刀伤出血，伤口疼痛：见血飞二钱，冰片五分，研成细末，混合外敷。

治风湿麻木疼痛：


1. 见血飞三钱，黑骨头三钱，排风藤三钱，斑鳩站三钱，追风伞三钱，红牛夕三钱，苕叶细辛三钱，岩川芎三钱，泡烧酒一斤半，每次服一小盃。

2. 见血飞二钱，小血藤三钱，五香血藤二钱，木通二钱，

牛夕三錢，茴香根三錢，伸筋草三錢，石楠藤二錢，香樟根三錢，泡酒服。

治毒疮，提脓生肌：見血飞根皮一錢，雄黃一錢，冰片五分研成細末混合，調麻油，外搽或將見血飞根皮刮成細末，撒于膏藥上，用以貼疮。

治飽脹：見血飞果一兩，枳實一兩，香樟根六錢，茴香根六錢，川芎五錢，研末，每服五分用酒吞服，或泡酒服。



見 血 飞

1.花枝, 2.果枝, 3.果实, 4.果实横断面。

佛 頂 珠

別名：报春花，白花草。

學名及科別： *Androsace umbellata* (Lour) Merr. 是櫻草科植物喉嚨草。

植物形态：一年生草本植物。到处皆有，多生于田野沼泽地区，高約三至五寸，鬚根，叶从根出，丛生，呈蓮座状平鋪地面，圓形或卵形，有柄，叶基心形，鈍鋸齒緣。全株密被白色茸毛。春日从叶丛中抽出細长的花茎，茎端分生多数花梗，上开白色小花，排列成繖形花序。花后結圓形蒴果，成熟时五瓣开裂，内含多数細小种子。

藥用部分及采集時間：全草或果实供藥用，三、四月采集全草入藥。

性味：辛，甘，微寒，无毒。

效用：祛风清热，劳伤腰痛，咽痛口糜，明目散翳。

方剂：治咽喉肿痛，白口疮：佛頂珠为极細末吹在患处。

治目翳初起：鮮佛頂珠內漿汁，点眼数次。

治五淋白浊：佛頂珠一两，苦竹一两，白糖一两，加水三小碗，煎湯两碗，一剂三次分服。

治咯血：佛頂珠三錢，炕干研末兌酒吞。

治跌打損伤或久坐腰酸腰痛：佛頂珠一两，仙桃草五錢，乱头发一錢，泡酒半斤，一天二次，每次服量不超过一两。



佛頂珠

1. 植物全形；2. 花剖开后示雄蕊着生；3. 果实，和宿萼。

乱 头 发

别名：土一支蒿，飞天蜈蚣。

学名及科别：*Achillea silirica* Ledeb. 是菊科植物蓍草。

植物形态：为多年生宿根草本，高约二至三尺，多生于阴湿山地或为园庭栽培。鬚根多簇生，春日发苗，茎直立，圓形，表面被有白色茸毛，叶腋常抽生枝条，叶互生，无柄，叶片长披针形，篦齿样羽状深裂，小裂片又作羽状浅裂或锯齿缘，綠色肉質，两面都被有較多的白色柔毛。夏末，枝梢开多数小形头状花，排列成复繖房花序；每个头状花具总苞，苞片卵圓形，綠色三至四枚，复瓦状排列；头状花序周围有七至十朵雌花。每朵雌花有舌状花冠一片，白色，先端三齿裂；花序中部有許多細小的管状花，两性，花冠頂端五裂，淡黄白色，花后結扁平瘦果。

药用部分及采集时间：根或全草入药，夏秋采集。

性味：辛，溫，有毒，有麻醉性。

效用：活血，祛风，定痛，治跌打损伤，毒蛇咬伤。

方剂：治跌打损伤：乱头发全草一两，泡酒涂擦，忌內服。

治跌打损伤，风湿疼痛：乱头发一钱，五香血藤五钱，見血飞二钱，黑骨头五钱，排风藤四钱，紅牛夕三钱，泡酒一斤，每次服一两。

治重伤止痛消肿：乱头发二钱，法半夏三钱，生白芷三钱，各药研成細末，混合成散剂，开水吞服，每服三分。

治毒蛇咬伤：乱头发，水慈姑，搗烂或晒干研末，調淘米水敷伤口。

治肚痛：乱头发，老鴉蒜，黄柏皮，牛耳大黃，研末，調浓茶敷之。

禁忌：1. 本药有剧毒，每服剂量不能超过三分。

2. 孕妇忌服。



乱 头 发

1. 植物全形；2. 小叶裂片；3. 头状花序；4. 舌状花；
5. 管状花。

辰沙草

别名：惊风草，瓜米草，小远志。

学名及科别：*Polygala japonica* Houff 是远志科植物瓜子金。

植物形态：为多年生常绿草本，生于山坡或土坎边。地下根多分枝，圆形弯曲，皮部黄白色肉质，茎着地丛生，长三至八寸，枝叶多而卧伏于地面生长，叶小互生，具短柄，卵圆形或椭圆形，革质，先端锐尖，基部楔形或圆形，全缘，羽状网脉，叶背主脉突出，全体呈绿紫色或紫红色，有微小毛茸。春日茎上抽花梗，上生二至五朵小花，呈总状花序；花萼紫色五片，离生，其中三片狭窄，披针形，余二片椭圆形，且较大，呈花冠状；花冠三片，基部联合，下侧两片对称，紫白色，上侧一片绿色，呈囊状，恰好包盖着雄蕊，其顶端有一束丝状突起；雄蕊八个，花丝几全部合生，雌蕊一个，子房扁卵形，花后结蒴果，扁心脏形，花萼宿存，二片花冠状的萼片已变成绿色，包着果实。种子二粒 卵形，密被白毛且具种阜。

药用部分及采集时间：全草入药，四季皆可采收。

性味：辛，苦，平，无毒。

效用：小儿惊风，止咳化痰，健胃消胀。

方剂：治小儿惊风：1.辰沙草二钱，佛顶珠一钱，煎水服。

2.辰沙草五分至一钱，开水吞服。

3.辰沙草三钱，尖经药三钱，青藤香三钱，煎水服。

治风热咳：辰沙草五钱，苦竹心十三根加白糖为引，煎水服。

治百日咳：辰沙草五钱，煎水兑蜂糖吃。

治小儿感冒：辰沙草一钱，兰布正五钱，射干五分，煎水服。

治头痛：辰沙草五钱，青鱼胆四钱，兰布正三钱，水皂角五钱，煎水服。

消腹胀：辰沙草末五分至一钱，开水吞服，一日三次。



辰 沙 草

1. 植物全形；2. 花的侧面观；3. 花剖开后示雄蕊，
4. 雌蕊；5. 果实（具宿萼）；6. 种子。

豆 豉 草

別名：下搜山。

學名及科別： *Iris gibirica* L. var. *orientalis* Maxim

系鳶尾科植物溪蓀。

植物形态：為多年生草本，高約一至二尺，多野生于山坡或山沟边。地下有鬚根，基部并分出細長的根莖，橫行蔓延，萌發新苗。全株平滑無毛。地上莖扁圓形，粗壯有節，表面綠色，草質，單葉互生，對稱排列，無柄，葉片劍形或長披針形，基部白色膜質且分開，緊包着莖，上部綠色，全緣，先端漸尖或銳尖，平行脈。夏日莖頂開花，單生、或兩朵集生；花被六片，二輪排列，外輪三片；花被大，向外反，淡紫色，有黃色斑紋，且中央有**鸡冠狀突起**，頗為美麗；內輪三片小，白色；雄蕊三個着生于花被基部，隱藏于柱頭背面，花約兩枚，雌蕊一枚，子房三室，柱頭三分，枝，頂端呈**鸡冠狀細裂**，蒴果，具三稜長圓形，內藏多數種子。

藥用部分及採集時間：根部入藥，四季均可採收。

性味：辛，平，無毒。

效用：消積行水，治胃痛腹痛。

方劑：治少腹食積，蓄水疼痛，大便不通：

1. 豆豉草五錢，石菖卜三錢，五谷子根三錢，煎水服。

2. 豆豉草三錢，猪鬃草三錢，萬年青三錢，煎水服。

3. 豆豉草，蜘蛛香，鼠麴草各五錢，煎水服。

4. 治疝氣：豆豉草根三錢，囊荷根三錢，茴香根三錢，煎水服。

5. 治小腹痛：豆豉草根干粉末，每次五分，燒酒吞服。

6. 治胃痛：鮮豆豉草一兩炒黃，再加紅糖炒焦，煎水服。



豆 豉 草

1. 植物全形；2. 柱头的裂片之一，并示雄蕊着生；
3. 雄蕊；4. 果实。

青 竹 标

学名及科别： *Neolepisorus phyllomanes* (Christ) Ching, 系水龙骨科植物，盾蕨。

植物形态：为多年生草本，多生于山林溪边或阴湿处。地下根茎长而横走，扁圆形，粗如竹筷，密被棕褐色鳞片，其上处处有叶基残痕，叶单生，多直立，高约一尺余，叶柄细长，坚韧黑色，基部多被鳞片，叶片羽状深裂，裂片多呈披针形，先端渐尖，全缘，质坚厚，叶面深绿色，叶背淡绿色，羽状网脉，中脉、侧脉、叶面、叶背均明显。孢子囊堆圆形，排列于叶背的中脉和侧脉两侧；或为不整齐多列。

药用部分及采集时间：全草入药，四季均可采收。

性味：苦，平，粘性甚大。

效用：清热，止血。

方剂：治跌打损伤，劳伤吐血：青竹标干的一两，泡酒半斤，每服一两。

治血淋：青竹标五钱，小木通四钱，车前草三钱，煎水服。



青竹标

青 魚 胆 草

别名：小龙胆草。

学名及科别： *Gentiana Scabra* Runge Ver. *intermedia* Kusnez. 是龙胆科植物筑紫龙胆。

植物形态：为多年生宿根草本，山野自生，高約一至二尺，分枝多少不一，叶对生，几无柄，卵圆形或卵状披针形，端尖，細锯齿緣，叶面深綠色，有光泽，羽网状脉，其中有三条較为明显的主脉。秋冬时节，茎端或叶腋間开花，单生，萼五裂，花冠基部联合成管状，上部为五裂，全形似喇叭状，且瓣片边缘羽状細裂，淡紫色，頗美丽。雄蕊五个。花后結长圆形蒴果，萼宿存，成熟时从頂端直裂，內藏多数細小种子。

药用部分及采集时间：九、十月采全草入药。

性味：苦，寒，无毒。

效用：清肝胆湿热，热咳虛咳，喉痛咯血。

方剂：治小儿疳积面黃肌瘦：

1. 青魚胆草根三个，蒸猪肝吃。
2. 青魚胆草三錢，鵝不食草三錢，地星秀三錢，用猪肉四兩，或鸡肝一副蒸吃。

治妇女产后寒（产褥热）：

1. 青魚胆草三錢，煎水加紅糖吃。
2. 青魚胆草一两五錢，破銅錢根一錢，地米菜花三錢，益母草五錢，加紅糖二兩，熬甜酒吃。

治虛热癆咳：青魚胆草二兩，炖肉半斤，內服。


治热咳痰中帶血：青魚胆草三錢，蒸甜酒一小碗內服。

治喉火：青魚胆草五錢，加水煎湯內服。

治感冒半边头痛：青魚胆草一两，加姜二錢，煎水服。

治小儿惊风：青魚胆草根三个，搗烂冲毛米湯吃或煎水服。

治疗毒：青魚胆草根，煎水服，并用叶子搗烂外敷。



青魚胆草

青 藤 香

别名：蛇参根，天仙藤。

学名及科别： *Aristolochia debilis* Sieb. & Zucc. 是馬兜鈴科植物馬兜鈴。

植物形态：为多年生纏繞性草本，生于山野树林下，地下有較粗的圓柱状根，有特殊香气，故名青藤香。茎細长草質，綠色，无毛，长可达丈許，常纏繞他物上升。老时强韌。单叶互生，叶柄細长且劲，稍有弯曲，叶片呈三角状卵形或披針形，先端鈍圓或略有微凹，全緣，基部深心脏形，且兩側呈圓耳状，草質，平滑无毛，深綠色，掌状网脉。夏日，叶腋开花，单生，有細梗，花被呈不整齐的喇叭状，基部膨大呈球形，中部收縮呈管状，球形花被內有六个肉質短而厚的花柱，愈合成环状包围柱头外側，子房下位，六室。花后結蒴果，橢圓形或近球形，成熟时瓣裂，內藏許多三角形扁平有膜翅的种子。

药用部分及采集時間：根和果实入药。（根挖取后不能用水洗，否则会走性）

性味：辛，苦，溫。

效用：順气，止痛，治蛇咬伤。

方剂：治胃痛：

1. 青藤香五分，用烧酒或开水吞服。

2. 青藤香末，地胆末，等量，成人每次服一錢，酒为引；小孩五岁以下每服五分，姜三片冲开水为引。

治发痧气痛：青藤香三錢，香附子二錢，石菖卜三錢，大木姜子三錢，茴香根二錢，木通二錢，泡酒或煎水服。

治瘴气发痧气：青藤香一錢，开水吞服。

治痞块：青藤香，石菖卜，大木姜子，姜黄，香附，广木香，各一两研粉混合，每次服一錢半，烧酒送下。


治水臌气胀：青藤香、鹿角刺子、石菖卜各一錢，研粉，开水送下。

治肝胃气痛：青藤香，广木香，大木姜子，人中白（炒），穿心莲，研末，連服三次。

治妇女小腹疼痛：青藤香，車前，扁蓄各二錢五分，煎水服。

治水泄：青藤香一錢，大木姜子五个，研粉，开水吞服。

治蛇咬伤：青藤香三錢，搗烂，煮水內服，取渣外敷伤处。



青 藤 香

1. 植物全形；2. 根；3. 花的縱切面观；
4. 雌蕊（已去花被）示子房、花柱体及其外側的花药；
5. 果实；6. 种子。

岩 五 加

学名及科別： *Acanthopanax* Sp. 是五加科植物。

植物形态：系木質藤本，長約三尺許，莖圓柱形，有節，節上與葉對稱部位，常生多數纏繞卷鬚，攀緣他物上升或爬岩壁行走。葉互生，為五出掌狀復葉，具長柄，葉柄基部有黃棕色膜質小托葉兩片，莖端葉多為三出復葉；小葉倒卵形或卵圓形，革質，疏鋸齒緣，端略尖，基部不對稱形或楔形，有短柄，葉面深綠色，有光澤，葉背灰綠色，羽狀網脈。

藥用部分及採集時間：全草入藥，四季可採。

性味：辛，澀，平，無毒。

效用：治風濕疼痛，跌打損傷。

方劑：治風濕：岩五加，刺五加，地五加，胖血藤，黑骨頭，各五錢泡酒一斤，每次服一兩。

治火眼：岩五加全草一兩煎水薰洗。

跌打損傷：岩五加五錢，巴岩姜三錢，鉄篴子三錢，石南藤、牛夕各三錢，泡酒服，每次服五錢。

治紅白痢：岩五加三兩，紅糖一兩，煎水吃。



岩 五 加

岩 白 菜

学名及科别： *Oreocharis primuloides*, Benth. et Hook. 是苦苣苔科植物岩桐。

植物形态：为多年生常绿草本，多生于山坡石缝中。地下根茎粗大有环节，上生多数鬚根。叶着地丛生，肉质肥厚，有粗短的叶柄，叶片椭圆形或广披针形，先端钝尖，全缘，叶面绿色，叶背灰白色，羽状网脉，叶背脉凸出，粗大，全体密披白色毛茸。夏日，叶丛中抽花茎，高可达一尺，顶端开花数朵，排列成繖形花序，花序基部有两个苞片，卵圆形，淡绿色边缘常带红色；萼五裂绿色，花冠五裂，呈唇形，雄蕊四枚，二长二短，短者无花药，长者花药聚生一起，雌蕊一个，柱头二裂，花后结长角果状的果实。

药用部分及采用时间：不分四季，采全草或根茎入药。

性味：甘，平，无毒。

效用：补虚，润肺，止咳，止血。

方剂：补虚弱，治虚咳：岩白菜三钱至一两，炖肉或猪心肺服。

治痰中带血，吐血：岩白菜五钱，加水和冰糖蒸服，数次即愈。

治白带：岩白菜，鹿含草，各一两，蒸老鸭吃。

治外伤刀伤出血：岩白菜（鲜）捣烂外敷。

治脚虚肿：岩白菜一两，炖猪蹄服。



岩 白 菜

1. 植物全形；2. 花剖开后示雄蕊着生；3. 雌蕊；4. 果实。

岩 洋 参

别名：綠花草。

学名及科別： *Campanula* Sp. 系桔梗科植物。


植物形态：为多年生宿根草本，高約一尺，野生于荒坡草丛中或丘陵地带。地下根約一寸长，肥壮，白色柔嫩，状如人参，故名岩洋参。全株密被白色毛茸，茎直立，多分枝，綠色。单叶互生，无柄，叶片橢圓形或披針形，先端尖，鋸齒緣，基部漸狹，叶面綠色，叶背淡綠色。夏日，枝梢或叶腋开花，单生；萼綠色，五裂，密被細毛，花冠紫色，鐘状五裂，多向上，少数下垂，雄蕊五个，花药大，花絲短，往往有二个退化雄蕊；雌蕊一个，柱头三裂。花后結球形蒴果。

药用部分及采集时间：全草入药，夏日采收。

性味：甘、微苦、平、无毒。

效用：补虛弱。

方剂：补虛弱：岩洋参五錢至一兩，炖肉吃或煎水吃。



岩 洋 参

1. 植物全形；2. 花；3. 雄蕊。

岩 苣 豆

别名：岩泽兰，岩茶。

学名及科别： *Lysionotus pauciflora* Maxim. 是苦苣苔科植物
石吊兰。

植物形态：为矮小常绿灌木，长约二尺，多生于岩壁上或寄生于大树上。根茎横走圆柱形，树枝状，其上有多数痕节，下侧生鬚根。地上茎直立，高约四、五寸，圆柱形，处处有叶柄残迹，单叶互生，簇生或略呈轮生，有短柄，叶片披针形或长椭圆形，先端钝尖，叶片上部有稀疏且大的锯齿缘，下部多为全缘。基部楔形，革质且较厚，绿色微带光泽，羽状网脉，除主脉明显外，侧脉细脉均不易察觉。夏季，茎端或叶腋间开花，花单生，偶有二花集生，萼绿色五瓣深裂，花冠筒形顶端大，五裂反卷，内面白色，外面带淡红色，二强雄蕊，花后结一至二寸的细长蒴果，果内有四室，每室藏有許多微小扁平的种子。

药用部分及采集时间：不分四季，采根茎或全草入药。

性味：甘，苦，平，无毒。

效用：润肺止咳。

方剂：止咳：


1. 岩苣豆全草一两，生姜三片，煎水服。

2. 岩苣豆全草一两，煎水，兑甜酒服。

治热咳：

1. 岩苣豆全草五钱，青鱼胆草五钱，岩白菜五钱，用水煎服。

2. 岩苣豆，追风伞，淫羊藿各五钱，煎水服。



岩 豇 豆

1. 植物全形, 2. 花, 3. 果实剖开, 4. 种子。

果 上 叶

别名：鴉雀嘴，一挂魚。

学名及科別： *Bulbophyllum inconspicuum*, Maxim. 系兰科植物麦斛之一種。

植物形态：为多年生常綠草本，多生于阴山岩石上或枯树上。地下根茎横走，其上密生茎节和鳞叶，下侧并生鬚根。根茎上侧处处抽假茎，茎短而肥壯，呈橢圓形或长橢圓形，有較粗的縱稜綫数条，通常一茎二叶，对生于茎端，叶有柄，叶片披針形，綠色肥厚，先端尖，全緣，基部楔形，直走平行脉，有主脉三至四条。

药用部分及采集時間：全草入药，四季均可采收。

性味：甘，微寒，无毒。

效用：清热，潤肺，止咳。


方剂：治风热咳嗽：

1. 果上叶二錢，刺老包三錢，煎水服。

2. 果上叶五錢，紅糖二兩，煎水分三次服。

治白口咳：果上叶一两，黃連一錢，蜂蜜五錢，煎水服。

治肺癆咳：果上叶五錢，白折耳五錢，炖猪肉半斤。湯和肉一次或二次服完，連服三剂。



呆 上 叶

茅 藜 根

學名及科別: *Rosa Roxburghii* Tratt.f. *narmalis*

Rebd.et Wils. 是薔薇科植物茅藜。

植物形态: 落叶灌木，丛生于路旁和丘陵荒坡地带。多分枝，高約三尺。茎具尖刺，刺多对生于叶柄基部；叶互生，奇数羽状复叶，小叶七至十三片，多数为九片，頂端一片叶一般較大，叶柄基部有鞘状托叶两片。小叶橢圓形或倒卵形，銳鋸齒緣，羽状网脉。春夏于茎頂开花，多单生，薔薇花冠五瓣，粉紅色有芳香，雄蕊多数，着生于花托上；雌蕊多数，子房下位，子房及花柱包在花托內，柱头聚合，凸出于花托中央呈圓形。果实为假果，扁球形，密被尖刺，頂端附有宿萼。成熟时呈橙黃色，內藏多数淡黃色堅硬的瘦果（俗称核仁）。

药用部分及采集时间: 根部及嫩叶尖入药，根随时可采。

性味: 酸，涩，平，无毒。

效用: 健胃止痛，消食去胀，治久咳久痢，叶可清热解毒疗痔。

方剂: 治慢性胃炎，胃痛：茅藜根煎成浓液，每日当茶饮，連服一周。

治痢疾：茅藜根一两五錢，石榴皮二两，芙蓉花五錢，煎水服。

治脾虛白痢，消化不良：茅藜根一两五錢，何首烏一两五錢，头暈药一两，加水煎湯，三次服完。連用二剂。

治上吐下泄，紅白痢：刺藜根一两，白矾一錢，煎水內服。

治外痔：茅藜叶尖焙干研末，調麻油敷患处。并可用本方煎水服。

治久咳：茅藜根，加糖煎服。

治濕熱黃疸：茅藜根五錢，煎水当茶饮，常服有效。

治小兒熱瘡：茅藜叶尖，搗爛敷患处。



茨 藜

- 1.花枝；2.小叶；3.花去花萼和花冠后，示雄蕊和雌蕊；
4.果实；5.种子。

刺 老 包

别名：雀不站。

学名及科别： *Aralia chinensis* L. 系五加科植物 楸木。

植物形态：为落叶大灌木，多生于水沟边或山林阴湿地带。高约六至九尺，全株密生大尖刺和棕色粗毛。茎圆柱形，有节。叶互生，二回奇数羽状复叶，叶柄长，基部膨大，着生处有一列尖刺轮生，其上侧密生茸毛，托叶二片着生于叶柄两侧，小叶对生卵形或广卵形，先端尖，锯齿缘，几无柄，棕绿色，羽状网脉。初秋茎端抽花梗，多数小花排列呈圆锥花序，花两性，整齐，花冠五瓣黄白色，雄蕊五个与花瓣互生，雌蕊一个，子房上位，柱头五裂，花后结球形浆果，成熟后呈黑色。

药用部分及采集时间：不分四季，采根皮入药。

性味：甘，寒，无毒。

效用：清热解毒，凉血止血，治痔疮，红崩白带白浊，喘咳。

方剂：治咳嗽，风热咳：刺老包三钱，果上叶二钱，水煎服。

治喘咳：刺老包四两，肉一斤炖之，服肉及汤。

治热咳：刺老包五钱，煨水服。

治红崩白带：刺老包四两，水二大碗煎至一中碗，去其渣，甜酒为引，煎内服。

治痔疮：

1. 刺老包四两（干的用五钱）炖猪肉半斤，分三次服。

2. 白刺老包根（俗名破凉伞）五钱，牛奶刺根五钱，山黄莲五钱，白茯苓五钱，阎王刺五钱，煨水服三次即愈。

治内痔：白刺老包，猪大肠头（直肠的一段）炖吃。

治蛇咬伤：刺老包根皮三钱，捣烂外敷。

治红崩：刺老包根五钱，阳雀花三钱，蒸甜酒内服。

治淋浊：刺老包根一两煮水吃。

治痈毒：刺老包根五钱至一两煎水内服。



刺老包

1. 植物全形；2. 花序；3. 花；4. 果实；5. 果序。

腎 經 草

学名及科別： *Habenaria, geniculata* D Don 是兰科长距兰属植物。

植物形态：为多年生宿根草本，野生于山坡草丛中，地下有椭圆形拇指大的肉质块根两个，其上侧茎基部分，生有多数肉质鬚根。茎直立，高一至二尺，綠色，圓柱形，有节，草質，表面有縱行稜紋。叶互生无柄，叶片卵圆形或披針形，淡綠色而略带光泽，先端尖，全緣，基部卷成筒状包着茎，直走平行脉。夏日，茎端生十数朵花，排列呈总状花序，花被六瓣，綠白色，二輪排列，外輪瓣片較大，卵圆形，內輪上側二片呈椭圆形，下側唇形，且其兩側細裂呈羽毛状，有长距一个，雄蕊六枚，四枚退化呈棒形，其余二枚花药膨大，花絲极短，全身光滑无毛。

药用部分及采集時間：夏秋間采块根入药。

性味：甘，溫，无毒。

效用：溫暖下焦，治疝气偏墜。

方剂：治走子：腎經草全草一两，煨甜酒服。

治睪丸炎（墜桃）：腎經草六錢，升麻五錢，煎水服。



腎 經 草

1. 植物全形；2. 花；3. 羽状分裂的花瓣；4. 雄蕊。

狗 牙 瓣

别名：小佛指甲。

学名及科别： *Sedum lineare* Thunb. 是景天科植物佛 甲 草。

植物形态：为多年生常绿草本，蔓生于岩石浅土上，或庭园栽培。高约三至八寸，地下茎多节，节上生鬚根，着地蔓生，地上茎绿色，肉质柔嫩，叶三片轮生，几无柄。叶片绿色，肥厚多汁，椭圆形或披针形，先端略尖，全缘，羽状网脉，主脉较为明显。夏日，茎端生多数黄色小花，排列呈繖房状的聚繖花序，花两性，整齐，萼片绿色，五瓣离生，花冠黄色；五瓣离生，雄蕊十枚，“个”字形，雌蕊五枚，离生，子房膨大，柱头渐尖。

药用部分及采集时间：不分四季，采全草入药。

性味：甘，淡，寒，无毒。

效用：清湿热，解火毒，治黄疸，外敷治疗疮，痈肿，鸡眼。

方剂：治黄疸：狗牙瓣（生）一两，炖瘦肉四两，内服。

治喉火：狗牙瓣五钱，捣烂，加蛋清冲开水服。

治风火牙痛：狗牙瓣一两，煎水服。

治乳痈红肿：狗牙瓣，卜公英，金银花，加甜酒捣烂外敷。


治跌打损伤：狗牙瓣，捣烂，敷患处。

治火疔：狗牙瓣全草，捣烂敷患处。

治脚生鸡眼：鲜狗牙瓣，捣烂调醋敷患处。

治目赤肿痛而生火翳：鲜狗牙瓣捣汁，加入乳点眼数次即愈。

治漆疮：鲜狗牙瓣捣烂外敷。



狗 牙 瓣

1.植物全形；2.花；3.雄蕊；4.雌蕊。

夜 关 門

别名：蝴蝶草

学名及科别： *Bauhinia paraglanca* Tang et Wang.

是豆科植物拟粉叶羊蹄甲。

植物形态：为攀缘性木質藤本，长约五至七尺，野生于山地土坡，全草被有稀少的紅棕色柔毛，茎近圓柱形而略扁，有稜，幼枝綠色，老干則变为褐色，茎上部叶腋多抽枝条，每一枝下部有对生卷鬚二个，卷鬚略为扁平，向內卷曲。单叶互生，有柄，叶片近于圓形或近于腎形，略似羊蹄，基部微凹或截形，全緣，頂端二裂至叶片中部，分裂处有一条綫形小鬚，长约二、三分，裂片先端圓形，叶面鮮綠色，无毛，叶背粉白色，并有棕色毛稀疏散布，往后仅叶脉处有毛。掌状网脉，主脉多为九条，偶有七条。夏日枝端抽繖房花序，上生十至十九朵花，花萼和花瓣各五片，离生，雄蕊三个，雌蕊一个，柱头头状。花后結莢果，长四至七寸，寬約一寸余，熟后干燥呈黑色，且有明显网紋。

药用部分及采集时间：夏秋采根入药。

性味：涩、平、无毒。

效用：收斂止血，治咳嗽遺尿、咯血，为止血要药。

方剂：治妇女子宫脫出（吊茄）：1.夜关门，螺絲肉，烘干研末，洗、服并用（內服量、夜关门 五錢）。

2.夜关门 五錢，枯礬粉 一錢，青藤香 三錢，用姜开水送下內服；外用蛇胆油涂搽。

治遺尿或夜間尿多：夜关门 一两，先以烧酒浸透，晒干，再用醋炒，然后炖猪肉半斤，或炖猪尿脬吃，三日一剂，連服三剂。

治咳嗽咯血、吐血：夜关门 一至二两，炖猪肺或煎水吃。

治大腸下血：夜关门 一两，芭蕉根 一两，苧麻根 五錢，皂角

刺二錢，黃精五錢，將藥放入猪大腸內，或煨甜酒糟服。

治紅崩：夜关门五錢，硃紅紙一張燒灰，陳棕三錢燒灰，煎甜酒糟服，三副痊愈；痊愈后，用白芍五錢，牡丹根二錢，蒸鸡一只吃。

治白帶：夜关门三錢，白芷三錢，白皮紙一張燒灰，煎甜酒糟服，重者六副，輕者三副；痊愈后用白芍五錢，牡丹根二錢，蒸鸡一只內服。



夜 关 門

- 1.花枝；2.花去花被后，亦完全雄蕊、退化雄蕊和雌蕊；
3.4.花瓣内外面；5.果实；6.种子的侧面；7.种子的正面。

花 蝴 蝶

别名：紅泽兰，蟠龙七。

学名及科別：Polygonum thunbergii Sieb et Zucc. 是蓼科植物鹿蹄草。

植物形态：为多年生宿根草本植物，多园庭栽培，或自生于原野潮湿处。根茎肥厚多分枝，略似姜而細小。初春发苗，茎直立或斜生，圓柱形，紫紅色，高可达三尺，有节，节膨大。叶互生，有柄或无柄，叶柄基部有托叶两片，一片呈圓盘状，另一片則呈鞘状包着茎；叶片略呈长卵形，先端尖，基部截形，叶面深綠色，并有紅白色花紋，全緣或有微波，基部截形，羽状网脉。夏日，茎頂叶腋抽枝条，枝梢簇生多数小花，而聚集呈球状；花小，两性，花被五瓣离生，淡紅色或帶淡綠色，雄蕊八枚，雌蕊一个，子房球形，上位，柱头三裂。果实菱形略尖，状如荞麦果。

药用部分及采集时间：夏秋掘根茎入药。

性味：甘、涩、平、无毒。

效用：补血收斂，止血治病，腎虛腰痛，接骨。

方剂：补虛弱，止盜汗：花蝴蝶（鮮）四两，蒸鸡內服。

治病疾：花蝴蝶二两煎水服，日服二次。

治大腸下血：1.花蝴蝶三錢，小血藤二錢，加甜酒一小碗，煎半小时服用。

2.花蝴蝶三錢，土升麻二錢，煎甜酒水服。

治腎虛腰痛：

1.鮮花蝴蝶一两（干者用三錢）蒸酒吃。

2.花蝴蝶五錢，万年青根五錢，野菸根五錢，泡清酒半斤，每服一两，日服二次。

治跌打风湿骨痛：花蝴蝶七錢至一两，母鸡一只炖服，或酒水各半煎服。

治跌伤肿痛骨折：花蝴蝶 一两，泽兰 五錢，搗烂加酒糟拌匀，微热外敷（热天可用冷敷）。

治跌打损伤：花蝴蝶（鮮）搗烂外敷，并用二两泡酒半斤內服，每次服用一两。

治九子痒（已潰者）：花蝴蝶根（鮮） 二两，炖猪肉吃（稍放盐），并取叶搗敷。

治湯火伤：花蝴蝶根为末，調麻油搽。



花 蝶 豆

1. 植物全形；2. 根茎；3. 花；4. 雌蕊。

观 音 草

学名及科別： *Reineckea carnea* Kunth. 是百合科植物吉祥草。

植物形态：是多年生草本，多生于斜坡土坎道旁及溪边。根茎匍伏浅土中或地面生长，綠色、淡綠色間或帶淡紫色；有节，下側生多数鬚根，节上或茎端丛生数叶，叶狭长而尖，呈綫形或长披針形，无柄，全緣，叶面深綠色，叶背略淡，直走平行脉，中脉显著。冬末、春初，从叶丛中抽茎，上生多数小花，排列呈穗状或总状花序，花两性，淡紫色，无柄，花被下部联合呈管状，上部深裂为六瓣，裂片多反卷，雄蕊六个，生于花被管上，花絲細长，雌蕊一枚，子房上位，花柱长，柱头头状，花后結漿果，圓形，成熟后呈紅紫色。

药用部分及采集時間：不分四季，采全草入药。

性味：甘，平，无毒。

效用：补肺止咳，接骨，补肾，止遺精。

方剂：治咳嗽：1.观音草一两，加生姜三片及紅糖，煎水服。

2.观音草一两，煎水服。

治喘咳：观音草一两，炖猪肺或肉吃。

治凉寒喘息：观音草、头晕药、升麻、各三錢，生姜一錢五分，煎水后加蜂蜜七錢五分吃。

治骨折：观音草（新鮮的）一两，捣烂，調酒糟包敷，可接骨止痛。

治黃疸病：观音草一两，蒸淘米水吃。

治目翳，疳积：观音草根三錢，猪肝三两，同煎湯吃，另取根末三錢，泡水当茶服。

治九子痒：观音草三錢，夏枯草五錢，煎水服。

色癆：观音草一两，常炖肉吃。



观 音 草

1. 植物全形；2. 花被剖开放大，示雄蕊着生；3. 果实。

观音柴

别名：小冬青。

学名及科别： *Ilex* sp. 系冬青科植物。

植物形态：为常绿小灌木，山野自生。茎高约三至五尺，枝叶茂密，叶互生有短柄，叶片长椭圆形或广披针形，先端尖全缘，基部渐狭，革质，叶面深绿色，有光泽，叶背淡绿色，羽状网脉。夏日，叶腋开绿色小花，排列呈穗状花序。花后结卵圆形果实，先端有小齿，绿色，并有斑点，熟后成黑紫色。

药用部分及采集时间：根入药，随时可采。

性味：苦，寒，无毒。

效用：清热，凉血，止血。

方剂：热重鼻衄：观音柴四钱，小金钱草二钱，煮酒吃。

治刀伤出血：观音柴捣烂敷。

咯血：观音柴四钱，硃砂莲二钱，煨水吃。


治风湿麻木酸痛：观音柴二两，枫香根一两，羊九七钱，红活麻根七钱，黑牵牛五钱，木通五钱。第一次用酒十二两蒸；（第二次半斤；第三次六两，）早晚各服一次，每次一两。

治吐血：观音柴根、红茶花、茅草根、水蜡烛根各二钱，一口血粉末一钱，前四药煎水后与一口血粉末同服。

治痢疾：观音柴一钱，炒红糖水吞服，治红痢。或观音柴一钱，大黄一钱，炒白糖治白痢。

治血崩：观音柴研末加白糖吞服。

跌打损伤：观音柴一两泡酒服。



观 音 柴

1.花枝；2.果枝；3.果实。

红 活 麻

别名：老虎麻，后老娘，大红活麻，小红活麻。

学名及科别：1. 大红活麻 *Urtica* sp. 是蕁麻科，蕁麻属植物之一。俗称老虎麻。

2. 小红活麻是蕁麻科植物，蕁麻（白活麻）*Urtica thunbergiana* Sieb. et Zucc. 变种之一。

植物形态：1. 大红活麻（老虎麻）为多年生草本，多野生于深山丛林中。地下有数条肥大柱状根，黄白色，长可达二、三尺，接近茎基部的附近有許多贅瘤凸起，茎大直立，高可达四、五尺，上有縱行深沟五条，横断面形似梅花，中空，每一凸起的下侧，有一个黄色半月形的維管束，表皮紅色，有白色圓形斑点（皮孔），尤以沟槽内为多，全株密生粗大歛毛，内含毒汁，觸及皮肤，則发生剧烈疼痛，而且迅速紅肿。单叶互生，具长柄，叶片大型，长五至六寸，寬三至四寸，有三至七个羽状深裂（以五裂为多），裂片披針形，先端尖，粗鋸齿緣，叶面鮮綠色，羽状网脉，叶背脉凸起。六、七月間叶腋开灰綠色小花，排列成穗状花序。

2. 小红活麻概形与蕁麻（白活麻）相似，多生于道旁。高一至二尺。茎有稜，带紅色。叶对生，具长柄，广卵圓形，掌状网脉，边缘重鋸齿。夏秋間，叶腋抽数条穗状的花序，花小，淡綠白色，雌雄同株，茎和叶密被长歛毛。皮肤觸之发紅肿，疼痛。

药用部分及采集时间：内服用根，七八月采集，茎叶可作浴湯随时均可采集。

以上两种药的功用相同；但以第一种老虎麻效力最好。

性味：辛，溫，有小毒。

主治：祛风，除湿，鎮痛，风湿麻木，小儿惊风。

方剂：治风湿疼痛麻木：

1. 紅活麻根煮水吃；外用茎叶輕打身上痛处。
2. 紅活麻 五錢，大血藤 五錢，透骨香 五錢，桂枝 五錢，牛夕 三錢，茴香根 三錢，硃砂連 三錢，制二烏各 二錢，荖叶細辛 三錢，泡酒 兩斤，每次服酒不可超过 一兩。
3. 紅活麻根 五錢，野葡萄根 五錢，野苦李根 三錢，金鈞連 三錢，浸酒 半斤，每次服酒 五錢。
4. 紅活麻根 一兩，白活麻根 一兩，火麻根 一兩，水楊柳（楊柳树伸入水中的細根） 三錢，白龙鬚 三錢，各药切細，加烧酒 一斤浸泡，制成药酒內服，每次服 一至二兩。

治风湿关节冷痛：紅活麻鮮根 五錢，草烏鮮根 五錢，生姜 一錢，葱 五錢，搗爛，用酒炒热，外敷关节。切忌入口。

治口眼歪斜（面神經麻痺）：紅活麻，杠炭灰，兌甜酒糟包患处，歪左包右，歪右包左，并用紅活麻煮稀飯吃，大鵝兒腸泡酒服。

治小儿惊风：小紅活麻嫩茎尖 七个，搗爛，兌第二次淘米水，去渣內服。



大紅活麻（老虎麻）

1. 枝条；2. 根。



葶 麻（白活麻）

1. 植物全形；2. 花。

响 鈴 草

学名及科別： *Crotalaria ferruginea* Grah. 是豆科植物假地兰。

植物形态：为多年生宿根草本，高約一至二尺，野生于山坡草丛中。地下主根圓柱形，粗壮而直，长可达尺余。地上部分全株密被棕色有絲光的粗毛，茎直立或斜生，圓形，下部多木質，上部草質且多分枝。单叶互生，有短柄或无柄，叶片橢圓形或长卵形，先端鈍圓或略有小尖，全緣，基部楔形，两面均密被棕色毛，質粗糙。羽状网脉，每一叶基部有托叶两片，呈披針形。夏日，茎梢及叶腋抽花梗，上生二至四朵小花，排列呈总状花序。总苞一枚，类似托叶，每花之萼片基部有小苞片，萼片深裂将至基部，长約五分左右，多超出花瓣；花瓣淡黃色，五瓣离生，大小不等，包被于萼內。花后結莢果，长約一寸，圓形粗壮，先端較大，并附有弯曲小鈎，基部略为狹窄，成熟时从腹面开裂，內貯多数棕綠色具有光泽的腎形种子。

药用部分及采集時間：夏秋掘根入药。

性味：甘、溫，无毒。

效用：腎虛，气虛，耳鳴，耳聾。


方剂：治气虛耳鳴：响鈴草一两，炖猪耳朵一对，加食盐服。

治耳聾：响鈴草一两，水皂角五錢，泡参三两，炖猪耳朵去渣服。

治虛弱气墜：响鈴草根五錢，一朵云三錢，炖肉服用。

治病后耳聾：响鈴草八錢，石菖卜三錢，煎水服。

治夜夢遺精：响鈴草五錢，夜寒苏五錢，爬岩龙五錢，毛药五錢，双腎草三錢，炖肉服。



响 鈴 草

1. 植物全形；2. 根和茎基；3. 花；4. 旗瓣；5. 龙骨瓣；
6. 翼瓣；7. 果实，示裂开；8. 种子。

兔耳风

别名：一枝箭、巴地香。

学名及科别： *Gerbera piloselloides* Cass. 是菊科植物毛大丁草。

植物形态：为多年生常绿草本，多生于阴湿山坡或土坎上。高约一尺。地下有颇多肥嫩鬚根。叶从基部着地丛生，有短柄或无柄；叶片倒卵形或椭圆形，肉质，叶端钝圆，基部楔形；全缘，羽状网脉，但支脉不很明显；叶面绿色有细柔毛，叶背密被白色细长茸毛，基部茸毛密而且长。春日，叶丛中抽一花梗，高约尺许，上亦密被细毛。顶生头状花序一个，具总苞，苞片多数，披针形，二至四轮排列，花有雌花及两性花，皆为白色，小花基部萼片均变成冠毛。在花序边缘，部分为雌花、花冠两瓣，基部联合呈管状，其中一瓣较大呈舌状。雌蕊一个，子房下位，柱头二裂，花序中部为管状小花，两性，花冠五裂，极小，基部联合呈管状，其中三裂几全部联合，余二瓣则分离且反卷。聚药雄蕊，花后结细小瘦果，并具冠毛。

药用部分及采集时间：全草入药，四季皆可采收。

性味：辛，温，无毒。

效用：止咳嗽，补虚弱，为止咳要药。

方剂：治久咳百日咳：兔耳风根二钱，煨肉吃，叶子泡开水吃。

治虚咳：兔耳风二至三两，蒸猪油吃。

治癆咳：兔耳风、鹿含草各五钱，炖猪心肺放少许盐服。

治咳嗽：兔耳风三钱，淫羊藿三钱，岩白菜五钱，岩豇豆五钱，煎水服。

治伤风咳嗽：兔耳风二钱虎耳草二钱，煎水一次服。

治咳嗽哮喘：兔耳风一两，蒸蜂蜜吃。

治骨蒸癆热盗汗：兔耳风七棵蒸子鸡吃。

治肺痛：兔耳风二两，水酒各半煎服。

治气胀：兔耳风五钱，煎水服。



兔 耳 风

1. 植物全形；2. 舌状花；3. 管状花；4. 片苞；
5. 聚药雄蕊；6. 雌蕊；7. 果实。

独 脚 蓮

别名：九到箍，重楼，蚤休。

学名及科别：*Paris japonica*, Franch. 系百合科植物。

植物形态：为多年生宿根草本。野生于山林阴湿处。地下茎横生粗壮，有环形结节，其上生鬚根，夏初抽茎，綠色，圓柱形，高一至五尺，无节，茎頂数叶輪生（通常为五至八片），叶片橢圓形，或披針形，綠色，先端尖，全緣，基部楔形。夏末，茎端叶丛中央再抽一花梗，开花一朵花被綠色，六至十片，二輪排列，外輪大，頗似叶；內輪狹长如絲，雄蕊十枚，花药长大黃褐色，雌蕊一个，膨大具五稜，柱头五裂，子房上位，全身光滑无毛。

药用部分及采集时间：夏秋掘根茎入药。

性味：辛，苦，寒，微毒。

效用：清热，解毒消肿，治痈肿，疔疮，腸痛，蛇咬伤，乳痛，乳癌。

方剂：治疔疮：

1. 独脚蓮，大蒜，搗烂，兌甜酒調匀外敷。
2. 独脚蓮粉末調醋外搽，或磨醋汁搽患处，三四次可好。
3. 独脚蓮半斤、土大黃一斤、木槿花半斤、韭菜一斤、制成粉，兌淘米水調敷患处，每天一次。

治癰：独脚蓮粉末五錢，天南星粉末一錢，用醋調搽患处。

治无名肿毒：独脚蓮。无名异，研末，加于菜油內搽患处。

治腸痛腹痛：独脚蓮粉末，三分至五分，开水吞服。

治乳痛乳癌：独脚蓮三錢，生姜一錢，加水煎湯內服，酒少許为引；另用芹菜搗烂外敷，效果更好。

治蛇咬伤：独脚蓮七分，生嚼，冷开水吞服，并用适量搗烂外包。

治阴道滴虫：独脚蓮一錢，天南星一錢，花椒一錢，雄黃一錢研末，用布卷成錠形，用热水浸后，塞入阴道。



独 脚 莲

1. 植物全形；2. 根茎；3. 退化的花瓣；4. 雄蕊；5. 雌蕊。

胖 血 藤

别名：毛血藤。

学名及科别：*Polygonum Convolvulus*.L.是蓼科植物莽麦蔓。

植物形态：为多年生蔓生草本，长约五至八尺，野生于丘陵或路旁。地下簇生数条肉质根，长可达尺许。断面内心血红色，地上茎圆柱形绿色，柔软，蔓生或缠绕他物上升。叶互生、有长柄，叶柄基部有细小托叶，叶片呈心脏形，先端尖，全缘，基部心形，纸质，绿色，掌状网脉。六、七月间茎梢和叶腋间抽穗状花序，花小，绿白色，萼五瓣，复瓦状排列，无花瓣，雄蕊八枚，子房一个，六室，花后结三棱形瘦果，果实成熟时萼片变为翅状，包在果外。

药用部分及采集时间：夏秋采肉质根入药。

性味：酸涩，微寒，无毒。

效用：欬肺，止咳，止血，治肺癆，止胃痛。

方剂：治肺癆咳嗽吐血：生胖血藤（去粗皮和木心）二两，炖猪肉吃。

治劳弱咳嗽：胖血藤五两，冰糖四两，胡椒四钱，泡酒一斤，每日早晚各服三钱。

治胃脘痛：

1.胖血藤根（干）五钱，蒸烧酒四两，每服药酒一两。

2.胖血藤，穿心莲各五钱，煎水服。连服数次。

治风湿：胖血藤，透骨香各一两，泡酒一斤每服药酒一两。



胖 血 藤

1.花枝；2.根和茎基；3.果实。

香 樟 根

別名：走馬胎

學名及科別：*Cinnamomum Camphora* Niss et Eberm 是樟科植物香樟樹。

植物形態：為常綠高大喬木，高可達十丈許，山野自生。全株有特殊芳香，單葉互生，葉片橢圓形或卵圓形，先端尖，全緣，基部漸狹革質，葉面深綠色有光澤，背面淺綠色，被有白粉，羽狀網脈，近基部發出主脈三條；春末新枝頂端或葉腋間抽總狀花序或復總狀花序，花兩性，花被六片二輪排列，淡黃色，雄蕊十二枚，四輪排列，雌蕊一個，子房上位，柱頭圓形，夏秋間結球形漿果，熟後呈紫黑色。

藥用部分及採集時間：根與果實入藥。根，四季可採；果實，秋季採收。

性味：辛，香，溫，無毒。

效用：理氣行血健胃，治胃病，筋骨疼痛，狐臭腳汗。

方劑：治氣脹、氣痛；

1. 香樟根末五錢，熬甜酒吃。

2. 香樟根皮，香樟子，厚朴，廣香，等分為末，每服五分至一錢，燒酒吞下。

治風濕跌打損傷，筋骨疼痛：香樟根五錢，鐵筷子五錢，白龍鬚五錢，岩川芎五錢（生的則各一兩）泡酒吃。早晚一次，每次服酒五錢。

治風濕疼痛：香樟根煎水外洗。

治腳汗：鮮香樟根皮搗爛，包腳底過夜，一二次見效。

治狐臭：香樟根為細末，加入生米飯混合成團，搓揉腋下，約四、五次可好。

治歪嘴風（面神經麻痺）：鮮香樟根二兩，楓香樹根皮五錢，混合搗爛外包（歪左包右，歪右包左）。



香 樟

1.果枝; 2.果实。

柳 叶 过 山 龙


植物形态：为落叶小木本，山野自生。地下根横行，圆柱形长而少分枝，肉质肥嫩，且多环节。茎细小，圆柱形，高约二尺，多有分枝。单叶互生，具短柄，叶片披针形至卵圆形，先端尖或锐尖，锐锯齿缘，稍带革质，绿色，羽状网脉。

药用部分及采集时间：夏秋采根入药。

性味：辛、温、无毒。

效用：治风湿骨痛。

方剂：风湿筋骨痛：柳叶过山龙五钱，铁筷子四钱，大血藤四钱，黑骨藤四钱，见血飞三钱，石南藤四钱，淮牛夕三钱，香樟根四钱，泡酒一斤，每服一两。



柳叶过山龙

茗 叶 細 辛

別名：大救駕。

學名及科別：*Asarum blunei* Duch. 系馬兜鈴科植物杜衡。

植物形态：為多年生草本，家種或自生于山野陰地。地下有根莖。白色有節，節上生多數鬚根，根莖頂端生二至三葉，叶有長柄，葉片心臟形，先端尖，全緣，深綠色且有白色斑紋，葉背淡綠色，羽狀網脈，支脈在葉緣處互相連接，冬日抽花莖，上生花一朵，花暗紫色下垂，單被，被片三裂，裂片廣卵形；雄蕊十二個，花柱六個合生呈筒狀。

本種與細辛 (*Asarum Sieboldi* Miq.) 相似，維細辛葉面無白斑。

藥用部分及採集時間：全草入藥，隨時可採。

性味：辛，溫。

效用：祛風除濕，鎮痛鎮咳。

方劑：治癆傷咳嗽：茗葉細辛五分，浸酒一小盃吞服，日服二次。

治百日咳：茗葉細辛五分开水吞服，日服三次。

治發痧氣痛：茗葉細辛五分，大木姜子三粒，青藤香一錢，茴香根一錢，研末泡開水吞服。

治跌打損傷風濕疼痛：茗葉細辛三錢，四塊瓦三錢，白龍鬚一錢，大血藤三錢，姜葉淫羊藿三錢，見血飛三錢，泡酒一斤，每服不超過一兩。

治風濕疼痛：茗葉細辛三錢，紅牛夕三錢，追風傘三錢，黑骨頭三錢，透骨香根三錢，毛青杠三錢，岩川芎三錢，鉄篋子三錢，五香血藤三錢，白荊條三錢，紅活麻三錢，岩五甲三錢，茨五甲三錢，鉄黃善三錢，共十四味藥，泡青酒一斤，每服二小盃，日服二次。忌食糯米蜂糖。

止咳：茗葉細辛根一寸，睡前開水嚼吃。

治腰痛：苕叶細辛根二两泡酒一斤，每次服葯酒一两；或打末每次一分，吞酒服。

治跌伤：苕叶細辛打末与酒煨涂搽患处。

治小儿惊风：苕叶細辛，尖原葯（生）各一錢煎水服。



荇 叶 細 辛

倒 触 伞

学名及科别：Rubus rosaefolius Sm. 系蔷薇科植物蔷薇莓。

植物形态：为落叶灌木，野生于道旁或山脚。茎粗壮，光滑无毛，散生多数钩状尖刺，表面被有白色粉霜，长三至五尺，常向地面弯，触地后即渐渐生出鬚根萌发新株。叶互生，奇数羽状复叶，托叶两片，披针形，叶柄灰绿色，散生倒钩刺，小叶多为七片，卵圆形或椭圆形，先端尖，锯齿缘，基部楔形，叶面深绿色，叶背灰绿色，羽状网脉。

药用部分及采集时间：触根入药，夏秋采收。

性味：涩，微辛，苦、平、无毒。

效用：收敛，凉血，止血，治倒经，喘咳盗汗。

方剂：治闪挫伤：鲜倒触伞根捣烂兑酒敷上。

治月经不調：倒触伞一两，对月莲一两，月月红花一钱，熬甜酒内服，一日三次。

治盗汗：倒触伞五钱，炖猪肉服用。

治小儿百日咳：倒触伞四钱，破铜钱四钱，钩藤根一钱，兰布正四钱，煎水服。

治黄疸喘息：倒触伞，水白菜，水高粱，各五钱煨水吃。

治脱肛并治红白痢：倒触伞，翻背红，枣儿红（地榆）各五钱煎水吃。

治倒经：倒触伞，白泡刺根倒触伞，猫爪刺倒触伞各四钱，泡酒一斤，每次一两，日服二次。



倒 触 伞

胭脂花

别名：白歛，（贵阳充当白歛用）

学名及科别： *Mirabilis jalapa* L. 是紫茉莉科植物紫茉莉。

植物形态：为多年生宿根草本，高可达三、四尺，园庭栽培或野生，地下有紡錘形块根，少分枝，肉質，表面棕黑色，内面白色。茎直立，圓柱形，稍粗壮，綠色，平滑无毛，分枝繁多，有节，节膨大，形似牛夕。单叶对生、具长柄、叶片卵圓形或心脏形，綠色，全緣，先端銳尖，基部截形或心脏形。羽状网脉，叶背脉凸出。夏日，枝梢开聚繖花序；花基部有总苞，苞片綠色，状似花萼，五瓣离生，卵形，先端尖，全緣。花萼則成高盆状，边缘有五浅裂，下部呈細管，白色或紫紅色，形如花冠，頗美丽。雄蕊五枚，花絲細长，伸出花外，雌蕊一个，子房近球形，下位，果实球形，成熟后呈黑色，內藏丰富的白色粉質。

药用部分及采集时间：根入药，秋季挖掘。

性味：甘，苦，溫，无毒。

效用：治赤白帶下。

方剂：治妇女白帶：

1. 白胭脂花根一两，白木槿五錢，白芍五錢，炖肉吃。
2. 白胭脂花根一两，白折耳五錢，續断一两炖肉吃。
3. 海螵蛸打末，每次五分，兑盐开水服，半小时后，再用白胭脂花根五錢，白木槿五錢，白折耳五錢，炖肉吃。
4. 白胭脂花根一两，夜关门一两，炖肉吃。
5. 白胭脂花根一两，泡通五錢，白芍五錢，夜寒苏五錢，煎水服。
6. 胭脂花根（鮮）八錢或（干）五錢，益母草五錢，藿香三錢，鸡冠花四錢，小血藤三錢，煎水吃。

本方用白鸡冠花，白胭脂花根治白帶。用紅鸡冠花，紅胭脂

花根則治紅崩。

治紅崩白帶：胭脂花根（紅崩用紅胭脂花根，白帶用白胭脂花根，）二至三兩，炖猪肉吃。

治紅崩：紅胭脂花根二兩，紅鸡冠花一兩，头晕药一兩，兔耳风五錢，炖猪脚吃。



胭 脂 花

1. 植物全形；2. 花的纵剖面；3. 雌蕊；4. 果实。

透 骨 香

别名：煤炭子，煤炭果。

植物形态：为常绿小灌木，多生于山林树荫下。地下根粗大，全株有强烈而特殊的气味，颇似冬绿油的芳香。茎矮，分枝多，长约二至三尺，枝叶常与地面平行生长，叶互生、着生处茎常呈曲折、宛如节，节节对称，曲折向前伸展，叶有短柄，叶片绿色，革质、卵圆形、少数长卵形，先端尖，微锯齿缘、茎部微凹或呈心脏形，羽状网脉。夏日，叶腋抽花梗，上生多数小花，排列呈总状花序，花两性整齐，萼片细小五裂，绿色或淡黄色钟状、花冠顶端五裂，雄蕊十枚，花丝肥短，花药上有小鬚，花后结紫黑色果实，熟时顶端五瓣开裂，果皮厚，肉质，内藏多数黄色种子。

药用部分及采集时间：根、茎、叶皆可入药，四季均可采收。


性味：辛、香、温，无毒。

效用：治风湿关节疼痛、跌打损伤。

方剂：治风湿关节疼痛：1、透骨香一两、小血藤五钱、白龙鬚一钱、牛夕五钱、泡酒二斤，每服约一两；并用透骨香茎叶、生姜、葱煎水外洗。

2、透骨香五钱，白牛夕五钱，宣木瓜五钱，白风藤五钱，大风藤五钱，白龙鬚三钱，泡酒二斤，每服药酒七钱至一两。

治跌打损伤：透骨香一两，土牛夕五钱，玉枇杷五钱，矮陀陀五两，铁筷子五钱，泡酒一斤，日服二次，每次一两。



透 骨 香

1. 着花的果枝；2. 根；3. 花；4. 花剖开后示雄蕊着生；
5. 雄蕊；6. 雌蕊；7. 种子。

追 风 伞

别名：一把伞。

植物形态：为多年生常绿草本，全身光滑无毛，高一尺许，多生于山林阴湿处，地下有小根茎，上生多数鬚根。根茎上数茎丛生，茎直立，圆柱形，绿色或带淡红色。叶多数聚集于茎顶，轮生或丛生，颇似伞形，叶片披针形，肥厚，先端尖，全缘，基部楔形，叶面深绿色，叶背色较淡，羽状网脉。夏日，叶丛间簇生多数小花，花瓣黄色，五片整齐，基部连合；雄蕊五个，二长三短，基部连合，花丝肉质，其上散生多数褐色斑点；雌蕊一个，子房上位。

药用部分及采集时间：根部入药，不分四季皆可采收。

性味：辛、香、温，无毒。

效用：驱风行血，治风湿瘫痪，小儿惊风。

方剂：治风湿麻木：追风伞五钱，红活麻五钱，大风藤一两，泡酒半斤，每次服二两。

治寒湿瘫痪：追风伞、藤五加、大风藤、閭王刺、姨媽菜，各二两，煎水服，每天一副，煎水服三次后，再煎水洗，连续使用。

治小儿惊风：追风伞三钱，金钩连（即金藤根）三钱，煎水服。

治脚抽筋：追风伞二两，伸筋草五钱，煨猪肉吃。



追 风 伞

1. 植物全形；2. 花；3. 雄蕊；4. 雌蕊。

姜叶淫羊藿

别名：山姜，九龙盘。

学名及科别：*Alpinia japonica* Miq. 系蕁苣科植物山姜。

植物形态：为多年生草本，山野自生，高約尺許。地下茎根状，多弯曲分叉，其上生鬚根，叶互生或根生，有长柄，几全部膨大，呈鞘状包着茎，叶鞘与叶片之間有叶舌，叶片卵形或长卵形，先端尖，全緣，基部楔形，綠色，横出平行脉，主脉明显。夏日，老茎叶中心抽一花梗，着生多数小花，排列呈穗状花序；萼圓筒形，不整齐三裂，綠色；花冠白色，不整齐，唇瓣为倒卵形，二裂，并杂有紅色条紋；雄蕊一个，假雄蕊二个，雌蕊一个，子房下位，花柱細长。蒴果，橢圓形，成熟后呈赤色，內藏多数种子。

药用部分及采集时间：根茎和叶，四季皆可采收。

性味：辛、溫，无毒。

效用：溫肺、散寒、止咳。

方剂：治久咳：

- 1、姜叶淫羊藿六錢，一朵云三錢，全当归五錢炖猪心肺吃。
- 2、姜叶淫羊藿根（制法：石灰水泡一天，用淘米水和清水洗淨，蒸熟晒干）二錢，白芷二錢，追风伞二錢，泡酒一斤，每服一两。

治癆伤吐血：姜叶淫羊藿，用童便泡七日，取出阴干，取用三錢，加一口血三錢，山高粱三錢，泡酒半斤，每服葯酒一两。

治虛弱咳嗽：1、姜叶淫羊藿三錢，大鵝儿腸三錢，炖肉吃。

- 2、姜叶淫羊藿粉末一两，核桃仁一两，加蜂糖二两，混勻蒸熟，制成龙眼大的丸子，含化吞服。

禁忌：热咳忌服。



姜叶淫羊藿

1. 植物全形；2. 花枝；3. 花；4. 雄蕊；5. 雌蕊；
6. 果实横断面。

蛇 泡 草

别名：老蛇蟠，金蟬草，三匹风。

学名及科别：*Duchesnea Indica*, Focke. 是蔷薇科植物蛇莓。

植物形态：为多年生草本，多生于路旁。茎細小柔軟，伏地蔓延。长一至二尺，茎有节，节上分枝，节下生鬚根。叶互生，三出复叶，具长柄，叶柄基部兩側有細小的托叶，小叶多为倒卵形，有短柄，粗鋸齒緣，羽状网脉，叶面深綠色，叶背綠色。三、四月間叶腋抽花茎，花单生，花冠黃色，五瓣离生，雄蕊雌蕊均为多数，萼片外有萼状总苞，果实紅色，細小，多数聚集于肉質花托上，呈聚合果。

药用部分及采集时间：春夏采全单入药。

性味：甘、酸、寒，无毒。

效用：清热解毒，治疮毒。

方剂：治小儿白口疮：蛇泡草研末，加枯矾末混合成药粉；先用盐水或淘米水加枯矾洗患处，再撒上药粉。

治疔疮：蛇泡草叶适量，加少許水，搗烂外敷。

治蛇头疮：蛇泡草五錢，搗烂，加冰片少許，敷患处。


治蛇窜丹：蛇泡草适量，雄黄五分，大蒜一个，共搗烂，用布包好，外搽。

治黄水疮：蛇泡草叶，鮮者搗烂敷之（用于热重者）。或炕干为末，退火后撒上，或用麻油調搽（用于黄水多而热輕者）。

治脓泡疮：蛇泡草炖肉吃；并用之搗烂外敷。

治花椒疮：蛇泡草，地星秀等分，搗烂外敷。

治痔疮出血：蛇泡草蒸甜酒服。



蛇 泡 草

蛇 倒 退

别名：地葡萄，貫叶蓼。

学名及科別：*polygenum perfoliatum* Linn. 是蓼科植物杠板归。

植物形态：为多年蔓生或攀緣性草本，野生于山地或道旁。茎长可达六尺，多分枝，綠色，上部草質，下部多木質，茎上有稜条，稜上有多数倒生鈎刺，叶互生，有长柄，托叶貫茎反卷，呈圓盘状，叶基盾状着生，叶片三角形，三边約略相等，質嫩脆，淡綠色，羽状网脉，叶柄及叶背脉上（尤其是中脉）多生小鈎刺，叶緣为全緣或散生小刺。夏日，枝梢或叶腋抽穗状花序；花小，两性，具总苞，每苞含二至四朵小花，花被白色或淡紅色，五裂复瓦状排列，不伸展，随果实而增大，并变为肉質，雄蕊八个，藏于花被內，雌蕊一个，子房上位，花柱上部三裂，柱头头状，瘦果，球形，坚硬包被于肉質的花被內。

药用部分及采集時間：不分四季，采全草入药。

性味：酸、苦、寒，有小毒。


效用：外用治疮毒。

方剂：治黄水疮：1、蛇倒退叶为細末，加适量冰片（蛇倒退叶一两冰片五分）混合，調麻油涂搽。

2、蛇倒退叶干末，黄泡叶干末等分，加冰片少許，調菜油外敷。

治湿疹，疥疮，痔疮：蛇倒退全草煎水洗。

治似麻风型的脱节癩：蛇倒退（紅色）煎水洗；另用辰沙草，旱蓮草，車前草，鮮者各一两五錢，煎水內服。



蛇 倒 退

1. 植物全形；2. 花；3. 花被剖开后示雄蕊；4. 雌蕊；
5. 果实，外附多肉的花被；6. 瘦果。

猪 尾 巴

别名：綠花菜。

学名及科別：系紫草科植物，

植物形态：为多年生草本植物。原野自生。地下主根粗大，肉質肥壯不分枝，形似猪尾。全株密被短茸毛，茎直立，圓柱形、高可达三尺，綠色，基叶丛生，形較大，具短柄，茎叶互生，无柄、叶片广披針形，先端尖，全緣，基部漸狹窄，綠色，羽状网脉，夏日，茎上部叶腋多生小枝，枝上和枝端抽花梗十数条，每一花梗，頂端开很多小花，排列成圓錐花序，萼五片綠色，密被細毛，花瓣五片，蓝色、整齐、离生复瓦状排列，瓣片卵圓形，基部有二浅裂的小舌，雄蕊五个，着生花瓣上，与花瓣互生。雌蕊一个，呈罐状、其基部四周围有环生的四个球样的东西。

药用部分及采集時間：春日掘根入药。

性味：甘、平，无毒。

效用：补虛弱、外治刀伤，瘰癧。

方剂：治刀伤出血：猪尾巴搗烂外敷

治瘰癧：猪尾巴，千年耗子屎，搗烂外敷。

治疗疮：猪尾巴，搗烂敷。

补虛：猪尾巴一至二两，炖肉內服。

治咳嗽：猪尾巴研末，蜂蜜为丸如黄豆大，每次吞服三粒。

治气虛心跳：猪尾巴、百尾笋、十样錯，各一两，炖肉一斤內服。

治九子痒：猪尾巴根搗烂（干的則粉碎），調甜酒糟敷患处。

〔治馬胀水〕：鮮猪尾巴根半斤，搗烂，兌六两烧酒灌下，馬，即时可消水。



猪 尾 巴

1. 植物全形；2. 花；3. 花瓣剖开后示雄蕊着生；
4. 花瓣；5. 雌蕊。

猪鬃草

别名：鉄絲草，猪鬃漆。

学名及科别： *Adiantum Capillus-veneris* Linn. 是水龙骨科植物石中珠。

植物形态：为多年生草本，喜生阴湿山林和石隙中。地下根茎短小，横行，密被黄褐色鳞叶，下侧生多数鬃根，上密生褐色茸毛。叶从根茎生出，直立，为二回羽状复叶；叶柄长，细圆坚硬，紫黑色有光泽，小叶扇形，互生，羽状排列，具短柄，基部楔形，叶端浅裂、叶面初呈红色，后呈绿色。叶脉由基部放射又作叉状分枝，孢子囊堆生于叶端，子囊盖由顶端叶缘向叶背反卷而成。

药用部分及采集时间：不分四季，采全草入药。

性味：咸、寒，无毒。

效用：清热，通淋，利尿，消乳结。

方剂：治白淋：猪鬃草五钱，煎甜酒吃。

治尿淋血淋：猪鬃草五钱，海金沙五钱，鉄絲紐五钱，煎水服。

治小儿尿结：猪鬃草二钱，谷精草二钱，加水煎汤内服。

治乳结不通：猪鬃草五钱，煎水服。

除风、消肿、通经络、解毒：猪鬃草八钱，五加皮五钱，防风五钱，威灵仙八钱，附子三钱，乌骨鸡一只，鸡去毛及内脏，连骨打烂，用白酒一斤，水二斤，与药同煎服。



猪 鬃 草

1. 植物全形； 2. 小叶。

野 油 菜

别名：石豇豆。

学名及科别：*Nasturtium montanum* Wall. 是十字花科植物蔊菜。

植物形态：为多年生草本，道旁庭园处处皆有。叶着地丛生，卧伏地面，上端多分枝，高可达一尺。叶基部为丛生，茎上为互生，有柄或无柄，叶片长椭圆形，或长卵形，绿色，羽状分裂或不分裂，边缘有不规则的锯齿，叶端钝形，羽状网脉。夏日，茎或枝端生多数小花，排列成总状花序；花小，花被四瓣十字形排列，绿色，雄蕊六枚，其中两枚略短，花药花丝皆为黄色，雌蕊一个较雄蕊肥大，且柱头冒出花外，子房上位，长角果，细小圆形，成熟时，自下而上，向两侧开裂，内有一膜质隔膜，其上着生多数细小卵形种子。

药用部分及采集时间：不分四季，采全草入药。

性味：辛、凉，无毒。

效用：清热解毒，止咳化痰，外用治漆疮、疔疮、肿痛。


方剂：治热咳：野油菜一两五钱，煎水服。

治头眩暈：野油菜（嫩的）切碎调鸡蛋，用油煎炒吃。

治漆疮：野油菜（鲜的）捣汁外搽，有特效。

治疔疮、肿痛：野油菜洗净，捣烂敷于患处，数次即愈。

治蛇伤：野油菜一两五钱，小火草一两，煎水吃，外用偷油婆（蟑螂）、小火草、雄黄、野油菜捣烂敷患处。



野 油 菜

1. 植物全形；2. 花；3. 雌蕊；4. 果实，示开裂；5. 种子。

野 青 菜

别名：山青菜。

学名及科别：*Crepis japonica* Benth, 是菊科植物黄鹌菜。

植物形态：为一年生或二年生草本，野生于山地或路旁。地下鬚根白色肥嫩。根叶着地丛生，形大，具肉质长柄，叶片倒披针形或倒长卵形，钝头，边缘羽状浅裂或半裂。初夏抽茎高可达二至三尺，圆柱形，有纵走稜纹。茎叶互生，无柄，长卵形或披针形，钝头，边缘羽状半裂或深裂，基部边缘有线状裂片，略反卷，叶片深绿色，羽状网脉。夏日，茎端及叶腋间抽花梗，上生多数细小的黄色头状花，排列成繖房状聚繖花序。每个头状花又由多数小花组成，具有总苞，苞片数层，绿色，其中小花边缘的为舌状花冠，中心的为管状花冠，舌状花为单性，黄色，雌蕊柱头二裂，外被白色冠毛。管状花为两性，花冠五裂，亦为黄色，花被外面亦被白色冠毛，花后结细小瘦果。

药用部分及采集时间：春夏采全草入药。

性味：苦，平，无毒。

效用：清热，解毒。

方剂：治风湿麻木瘫痪：野青菜四钱，白龙鬚一钱，切细，煮猪肉半斤吃。

治火淋：野青菜三钱，煮甜酒内服。

治火眼：野青菜五钱，蒸鸡肝或猪肝内服。

治白带：野青菜（鲜）五钱至一两，切细，煎绿壳鸡蛋三个，内服。

治烂疮：野青菜根阴干研末，用麻油调敷。

治汗闭：野青菜一两，煎水服。



野 青 菜

1. 植物全形；2. 舌状花；3. 管状花；4. 果实。

粘 人 草

别名：山馬蝗。

学名及科別： *Desmodium Spicatum* Rehd. 是豆科植物总状花序山馬蝗。

植物形态：为落叶灌木，多生于山坡草地或林丛中。茎直立，圆柱形，下部毛多脱落。新枝及叶、花梗、果实等均密被棕色短毛。叶互生，棕绿色三出复叶，具长柄，叶柄基部具托叶两片，细小绿色，小叶片均有短柄，倒卵形或卵形，先端短尖或钝圆，基部阔楔形或不对称形，全缘或微有浅波，羽状网脉，夏秋间，茎顶抽生总状花序，多为两个花聚生一起，萼片五裂绿色，蝶状花，紫红色，荚果，有四至七个荚节，密被棕色茸毛。种子肾形。

药用部分及采集时间：夏秋间掘根入药。

性味：酸，微苦，辛，平，无毒。

效用：调补收敛，止咳止吐，外用治顽癣。

方剂：补气血，止虚汗：粘人草根一两，蒸鸡吃。

治百日咳：粘人草根五钱，果上叶五钱，煎水服。

治呕吐健胃：粘人草根一两煎水服。

治顽癣：粘人草全草熬膏涂搽患处，有特效。



粘 人 草

1.果枝；2.花；3.雄蕊；4.两体雄蕊；5.雌蕊；6.果实；7.种子。

堵 拉

别名：耗子枕头

学名及科别：Trichosanthes Cucumeroides Maxim 是葫芦科植物王瓜。

植物形态：为多年蔓生宿根草本，山野自生。全身有茸毛，粗涩。地下有肥壮的圆柱形或纺锤形块根，常数条相聚，长者达尺余，肉质，味极苦，地上茎纤细柔软，全长可达丈余，茎上生单一的卷须，攀缘他物上升，或匍伏延伸，叶互生，具长柄，叶片广卵形，多为掌状不整齐三至五个浅裂，基部心脏形，掌状网脉，夏日叶腋开花，花单性，雌雄异株，雄花三至十五朵，排列呈总状花序，花萼筒状五裂，花冠淡黄色筒形，上部五裂，裂片卵状披针形，且边缘呈丝状羽裂，雄蕊三个，雌蕊单生，形状与雄花同，但呈白色，子房一个，柱头三裂。花后结椭圆形浆果，成熟时成朱红色，内含多数黄黑色种子。

药用部分及采集时间：夏秋间，采地下块根入药。

性味：大苦，大寒，微毒。

效用：催吐，泄下，外搽治头风疼痛。

方剂：催吐：堵拉粉末五分，开水吞服。

治食积胃痛：堵拉粉，每次用冷淘米水各服三分。每三天服一次。

治头风疼痛：堵拉磨酒成浓液（约一钱药磨酒二两），火燃烧酒后浓液用以揉搽太阳穴，约二小时一次。

本药剧烈，服用量不得超过五分。



堵 拉

- 1.块根；2.雄花；3.雌花；4.雌蕊纵剖；5.果实；
6.果实的横断面。

排 风 藤

别名：毛秀才。

学名及科别：*Solanum lyratum* Thunb. 是茄科植物白英。

植物形态：为多年生草质藤本，多生于山地竹林和树林中。全体密被黄棕色茸毛，长约四、五尺，地下有蔓生根，根上生数条藤状茎，叶互生，有长柄，叶片绿色稍肥厚，长卵形，先端尖，全缘，基部附近有对称的深裂，羽状网脉，夏秋叶腋抽花梗，开白色花，呈圆锥花序。花冠五裂，整齐，雄蕊五个，雌蕊一个，子房上位，花后结球形浆果，成熟后呈红色，内藏多数种子。

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。

性味：微苦，温，无毒。

效用：祛风解毒除湿，治小儿惊风，瘰癧。

方剂：治小儿惊风脐风：排风藤三钱，钩藤三钱，胆南星一钱，艾叶五钱煎水服。（小儿脐风则用三分之一量）

治小儿惊风：鲜排风藤嫩叶尖七个，阎王刺根三钱，生姜三片，煎水服。

治慢惊风：排风藤一两，煎水，用老鹰瓜在药水内磨，然后内服。

治九子痒：排风藤一至二两，九子连环草一两，夏枯草一两，包于白布内，炖猪耳一对，每日三次，饭后服。

治乳痛：排风藤根一两，酒水各半煎服；取渣加酒糟调敷患处。

治湿疹日久不愈：排风藤一两，包于布内加猪大肠半斤，酒水各半炖服。

治风湿关节痛：排风藤一两，忍冬一两，五加皮一两，好酒一斤，泡服。



排 风 藤

1.枝条；2.根茎；3.花；4.果实；5.果实的纵断面。

梅 花 刺

别名：打油果。

植物形态：为落叶灌木，高约三尺，多生于山坡和丛林中。茎圆形，绿色，叶腋处有刺状短枝，刺端略尖，长约一寸至一寸半。上生叶，叶互生，具短柄，叶片椭圆形、长椭圆形或长卵圆形，绿色革质，且略带光泽，先端尖基部楔形，细锯齿缘，羽状网脉。冬季，叶腋或刺状短枝上抽花梗，上生多数小花，排列成总状花序，每个花柄基部有一披针形小叶，花萼五片，绿色，花冠白色或淡黄白色，五瓣离生，整齐，雄蕊多数，雌蕊一枚，子房上位。浆果椭圆形，初呈绿色，熟后呈黑紫色。

药用部分及采集时间：根部入药，四季皆可挖掘。

性味：酸，苦，温，无毒。

效用：敛肺，止虚咳，久咳。

方剂：治虚咳，久咳：梅花刺四两（干二两）炖猪肉（肺癆咳），或煎水服（一般咳嗽）。

禁忌：吐血者禁服。



梅 花 刺

1. 植物全形； 2. 花； 3. 果实。

重 鯁 串

别名：田边菊。

学名及科别：*Aster indicus* L. 是菊科植物馬兰。

植物形态：为多年生草本，遍生于田野路旁。地下根茎在浅土中蔓延生长，繁殖力很强。初春从根部长叶，着地丛生，有柄，叶片为倒披针形或椭圆形，先端尖，边缘有稀疏的粗锯齿或缺刻，基部渐狭，绿色，羽状网脉。初夏从叶丛中抽茎，高约一至二尺，圆形，绿色，上部多分枝，茎叶互生，形较小。中部的，多齿牙缘，顶端的，几全缘，披针形。六、七月间，各枝梢生一头状花序，花序基部有总苞，苞片绿色；椭圆形，边缘及背面密被细毛，花序周围为单性雌花，有蓝紫色的舌状花冠；花序中部为细小两性的管状花，花冠上端五裂，淡黄色。花后结细小瘦果。

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。

性味：辛，苦，平，无毒。

效用：消食，通便，清热，驱风。


方剂：消积食：

1. 魚鯁串一两（干用六钱），煎水服。

2. 魚鯁串一两，土知母一两，煎水服。

治食瘕：魚鯁串根末三钱，温开水吞服，发病前一、二小时服。

治小儿热痢：魚鯁串二钱，仙鹤草三钱，馬鞭草三钱，木通二钱，紫苏二钱，鉄灯草二钱，煎水服。



魚 鰍 串

1. 植物全形； 2. 舌状花； 3. 管状花； 4. 苞片。

黃 瓜 香

別名：黃花香。

學名及科別：*Viola kiusiana*, Makino 系堇菜科植物。

植物形态：為多年生草本，高五至八寸，多生于山野陰濕處。地下有細小頭狀根莖，上生多數細根，全株有細毛，莖綠色細柔，多匍伏生長或斜生；有節，節着地生根，并萌發新苗；葉多簇生，少互生，具長柄，葉柄基部略為膨大，葉片卵圓形或卵狀橢圓形，先端鈍圓，邊緣鈍鋸齒或淺波狀，基部截形或急狹；鮮綠色，羽狀網脈。莖葉互生，小，披針形，春夏間葉叢中抽花梗，梗上着生一花；萼五片，綠色，密生細毛，基部着生半圓形短耳；花冠不整齊，五瓣離生，有花距，白色或淡紫色，花后結蒴果，三瓣開裂，內藏多數卵形種子。

藥用部分及採集時間：春夏採全草入藥。

性味：辛，苦，寒，無毒。

效用：清熱解毒，治惡瘡。


方劑：治走游黃（瘡毒引起淋巴腺炎）：黃瓜香搗爛包患處。

治馬夾嘴（腮腺炎）：黃瓜香搗爛包兩頰。

治對嘴瘡：黃瓜香搗爛調醋包患處。

治紅淋：黃瓜香和扁蓄各五錢煎水服，或搗爛沖淘米水后去渣內服。

治火疔：黃瓜香搗爛包患處。



黄 瓜 香

1. 植物全形； 2. 花； 3. 果实； 4. 种子。

黃 葵

學名及科別：Hibiscus manihot L. 是錦葵科植物黃蜀葵。

植物形態：為多年生草本或亞灌木，高約三至五尺，多為庭園栽培。根粗壯多肉，莖草質或下部木質，灰綠色或綠色，圓柱形，全身密被棕褐色硬毛，單葉互生，葉柄長，圓柱形，托葉兩片，披針形，葉片掌狀深裂，多為五至七裂，基部深心形，裂片先端尖，邊緣有粗鋸齒，掌狀網脈。夏日，莖端着生多數大型花，排列呈總狀花序，花柄基部兩側生有小葉兩片，兩性花，整齊；萼綠色五片離生，卵圓形，花冠五瓣，倒卵形，鮮黃色，有很多金黃色的脈，且基部有黑褐色類圓形的斑紋，雄蕊多數，花絲聚合，雌蕊一個，子房上位，卵形，柱頭五裂，黑紫色，且密被茸毛；蒴果，瓣裂，內藏多數腎形扁薄的種子。

藥用部分及採集時間：夏秋採全草入藥。

性味：甘，淡，平，無毒。

效用：治惡瘡疔瘡。

方劑：治多年爛瘡：黃葵根三錢，白玉簪花根三錢，堵拉一錢，老君鬚三錢，苦金盆一錢，煎水服。

治疔瘡（烏頭疔）：鮮黃葵葉搗爛（或干的為末）調醋或蜂蜜外敷。

治飛疔：鮮黃葵根一兩煎水服。



黄 葵

1. 植物全形；2. 根；3. 雄蕊；4. 雌蕊；
5. 柱头顶上正面观；6. 果实；7. 种子。

斑 鳩 窩

別名：奶漿草。

學名及科別：*Euphorbia. humifusa* Willd. 系大戟科植物地錦草。

植物形態：為一年生草本，生于田野荒地。主根明顯。數莖從根際生出，平臥地面，長約三至五寸，莖細柔略帶紅色，葉腋多抽枝條。單葉互生，几無柄，葉片形小，橢圓形，先端鈍圓，紅綠色，全緣，羽狀網脈，背面常有斑點。夏日，莖頂或葉腋生黃褐色小花，雌雄同株，雌蕊懸于花外，子房上位，花后結細小蒴果。內藏卵形種子三粒。

藥用部分及採集時間：夏秋採全草入藥。

性味：辛，微苦，平，無毒。


效用：清熱解毒，治爛瘡，小兒疳積。

方劑：治小兒疳積，斑鳩窩一至二錢，地星宿三錢，蒸雞肝吃三次。

治火眼，斑鳩窩熬水洗或蒸豬肝吃。

治臃瘡爛瘡：斑鳩窩為末外搽。

治熱痢：斑鳩窩生的五錢，煮甜酒服。



斑 鳩 窩

1. 植物全形，2. 花；3. 果实；4. 果实横断面；5. 种子。

朝 天 罐

别名：向天罐，痢疾罐。

学名及科别：*Osbeckia Crinita Benth* 是野牡丹科植物向天葫芦。

植物形态：为多年生草本或半灌木，长约二至四尺，多野生于山坡上、地下有块状木质根茎，地上茎草质，或下部木质上部草质，具三稜，稜上生有较多的棕色粗毛；叶对生，具短柄或无柄，叶片卵圆形或长卵形，先端尖，全缘，叶面深绿色，叶背绿色，网状脉，主脉多数为五条，两侧的主脉成弧形，细脉明显，横行。夏日，茎端或叶腋间抽花梗，每一花梗，着生三朵花，排列呈歧繖花序，花两性，形大，整齐而美丽，有短柄，柄基部有卵形小苞片一枚，萼四片，离生披针形，其上密生硬毛，此毛有一至四节，节节轮生小毛，花瓣四片，为美丽的紫色，雄蕊八枚，鲜黄色，花丝弯曲，花药细长，基部大，向上渐次细狭如线状，且向内弯曲，雌蕊一个，子房呈卵形，上部有放射状的细毛，花柱细长粉红色，柱头略大。花后结壶形蒴果，且上部收缩呈颈状，全形颇似罐子，裂口向上，故名朝天罐。成熟时，顶端盖裂，内藏多数细小种子。

药用部分及采集时间：夏秋采根与果实入药，而以果实为最好。

性味：酸涩，微寒，无毒。

效用：清热，收敛、止血，治痢疾，虚咳，咯血。

方剂：治小便失禁：朝天罐根五钱，响铃草根五钱、炖猪尿脬吃。

治痢疾：

1.朝天罐根五钱，红痢，加红糖；白痢，加白糖煎服。

2.朝天罐根三钱，车前子三钱，老萝卜根三钱、红糖三钱，煎服。

治肺癆咳嗽咯血：

1. 朝天罐根五錢，炖猪肉吃，三天一剂，輕者連服二剂，重者連服五剂。
2. 朝天罐五錢，葵花盘四錢，柿花蒂二錢，一朵云三錢，清明菜三錢，煎水服。

治虛弱咳嗽：朝天罐五錢、杏仁五錢、桃仁三錢、炖猪肉或煎水服。

治白帶：朝天罐根五錢，蒸酒內服。

治痔瘡：朝天罐根一兩、炖猪心肺服。

治九子瘍初起：朝天罐根五錢，切細炖猪肉吃，連用五剂，另用糯米藤根一兩，搗爛外敷。



朝 天 罐

1.根；2.花枝；3.果枝；4.雄蕊；5.雌蕊；6.种子；
7.萼上的分枝毛茸。

散 血 草

植物形态：为多年生草本，多生于沼泽及水沟边。地下有根茎，轴心小，由多数茎聚集而成，下部着生许多黄白色肉质须根，地下茎丛生，直立高尺许，草质有四稜，下部淡红色，上部绿色多有分枝，单叶对生，无柄，叶片披针形或长卵形，先端渐尖、基部渐狭，绿色全缘，羽状网脉。五、六月间支梢抽总状花序，向下弯或向内卷曲，萼绿色五瓣深裂，裂片呈披针形，花冠白色，顶端五裂，雄蕊五枚，花丝细长，花药“个”字形着生在花丝上，雌蕊一枚，子房上位，球形，花柱细长，柱头略膨大。全株平滑无毛。

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。

性味：辛、酸、温、无毒。

效用：行血散瘀。

方剂：治妇科瘀血，经闭腹痛：散血草(鲜)每次五钱，蒸烧酒内服。

治关节疼痛：散血草根(干)三钱，蒸烧酒内服。



散 血 草

1.植物全形；2.根和茎基；3.花；4.雄蕊；5.雌蕊。

搜 山 虎

别名：万年匐，山洋芋。

植物形态：为多年生草本，高約一尺，野生于山林阴湿处。地下有球形块状根茎数个，多則十数个，成串排列，肉質，內藏丰富淀粉，外形頗似洋芋，故有山洋芋之名。上生多数鬚根，此球状根茎可保存若干年而不腐烂，也不变硬，故又名万年匐（柔軟之意）。地上茎时有小枝，圓柱形直立，肉質，淡紫紅色，处处可見叶的残迹。叶多密集茎端，互生、具短柄或无柄、叶片披針形，肉質，先端漸尖，基部漸狹，边缘有疏鋸齿，叶面主脉兩側有黑紫色和白色交錯的花紋、羽状网脉，叶背脉凸出。春日叶腋或茎頂抽小花梗、每一梗上有二至三朵花集生、排列成总状花序、多下垂、花小、白色、两性。

药用部分及采集時間：春夏采地下球茎入药。

性味：辛、热、有毒（麻醉力强）。

效用：鎮痛、行血，接骨。

方剂：治伤后瘀血作痛：搜山虎三錢，七叶黃荊根一两。用小便浸七日，再放屋上露七日，研末每服一錢。

治疮毒：搜山虎全草搗烂外敷。

外伤接骨：搜山虎五錢，水冬瓜根皮，烂茶泥，玉枇杷各一两，共研末、用甜酒糟調勻，适量外敷。



搜 山 虎

順 經 草

学名及科別： *Scutellaria indica* L. 系唇形科植物印度黄芩。

植物形态：为多年生草本，高約七、八寸，自生于原野和林旁。

地下鬚根多数，茎直立四楞，淡紫紅色，时有分枝，叶对生，綠色，有长柄，叶片卵圓形或心脏形，波状緣或鈍鋸齿緣，叶端鈍，羽状网脉叶背凸出，全体密被白色毛茸。夏日，茎上部叶腋处开多数小花，聚集呈总状花序，萼片綠色且密生毛茸，其中一片大的呈圓盘状，余二片为唇形。花瓣紫色，唇形，雄蕊四枚，二强二弱，雌蕊一个，子房上位，花柱长，略露于花冠外，柱头二裂，坚果，內藏四粒种子。

（大鵝耳腸也有称“順經草”的。名虽同，实系两种药草。）

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。

性味：苦、寒、无毒。

效用：平肝清热。

方剂：治肝火旺，煩躁：順經草二錢至三錢，煎水服。



順 經 草

1. 植物全形； 2. 花； 3. 雄蕊； 4. 雌蕊； 5. 苞和花萼。

鹿 角 刺

别名：鉄包金，亮高柴。

学名及科别：Rhamnus Sp.系鼠李科植物鹿角刺。

植物形态：为落叶灌木，高可达一丈，山林原野自生。茎圆柱形，表面有頗多皮孔斑点，老干上有粗刺状的短枝，上生叶，且开花結果。叶对生，有柄，叶片长椭圆形，或长倒卵形，先端尖或鈍圓，基部漸狹，边缘有細微的鋸齿，叶面深綠色，叶背色較淡。羽状网脉，側脉四至七条，夏日叶腋开淡黃綠色花，雌雄异株，雄花一至十八朵丛生，雌蕊花一至三朵生长一起。花后結球形核果，成熟后变为黑色。

药用部分及采集时间：根与果实入药，根，随时可挖采，果实，十月分采集。

性味：苦、寒、无毒。

效用：逐水消肿，治食积臌胀。

方剂：治水肿：1.鹿角刺根，糯米粳，紅糖各一两，先将鹿角刺煎水，再将糯米粳，紅糖加入煎汁中，煮如稀飯食下，肿消停服。

2.鹿角刺果，糯米粳，紅糖各一两，煎水吃。

治腹水：鹿角刺果（新鮮）三十至四十粒，生嚼溫开水送下，服后两小时便泄黃水；随服冷粥即止。

消积食：鹿角刺果一錢，研成細末，开水吞服。

下水臌，消肿胀，胸水：鹿角刺一两，渊头鸡（拳参）五錢，加水煎湯，一日三次分服。

禁忌：体虛者慎用。



鹿 角 刺

1.植物全形, 2.果实

路 边 金

学名及科別： *Serissa Serissoides*, (Dc) Druce 系茜草科植物白骨馬。

植物形态：为半落叶灌木，山野道旁、坡地、林丛中处处皆有。

茎分枝繁多，高約一至二尺，叶对生或丛生于枝上，具短柄，叶柄兩側有細小綫形托叶，叶片倒卵形倒披針形或橢圓形，先端鈍尖，少有微凹，全緣，基部漸狹，叶面深綠色具有光泽，叶背淡綠色，稍革質，羽状网脉。夏日枝端叶腋間生数小花，萼片五裂，綠色有毛，花冠白色，管状，管口較大，五裂，管口內有頗多白色細柔毛；雄蕊五个，“丁”字形着生，雌蕊一个，花柱細长，柱头膨大，子房下位且具五稜，花后結蒴果。

本种与滿天星 *Serissa Foetida* Comm 极为相似，惟滿天星的萼片与花瓣长，为主要区别。

药用部分及采集時間：全株入药，四季均可采收。


性味：辛、凉、无毒。

效用：清热解毒。

方剂：治淋症：路边金二两，土伏苓三两，魚鳅串一两，煎水服。

治眼翳：路边金根皮为細末加硼砂，冰片用人乳浸湿，灯草蘸汁点眼。

治火牙痛：路边金五錢至一两煎水吃。



路边金

1.花枝；2.花；3.雄蕊。

鐵 筷 子

別名：臭蠟梅，雪里花，岩馬桑，鑽石風。

學名及科別：Chimonanthus praecox L. 為蠟梅科植物蠟梅。

植物形態：為落葉灌木，園庭栽培作觀賞植物也有山野自生的。高可達丈余，枝干表面有頗多黃白色斑點(皮孔)，葉對生，有短柄，葉片卵圓形或長卵形，先端尖，基部楔形或略微圓形，全緣或有微細鋸齒，葉面深綠色，有白色短刺毛向葉尖方向斜生，用手摸有粗糙感，尤以自葉尖向基方向摸最為粗澀；葉背綠色，羽狀網脈，葉面脈微下陷，葉背則脈凸出，被有較長的茸毛，但柔軟無粗澀感。秋季落葉，臘月開花，花沒有芳香气味。萼片花瓣狀，黃色，內層花瓣較短，為紫褐色。果實卵圓形，長一寸許，上有橫裂痕迹。

藥用部分及採集時間：根和花入藥，四季皆可采收。

性味：辛，香，溫，無毒。

效用：治跌打損傷，風濕骨痛，氣滯腹痛，止咳定喘。

方劑：治跌打損傷：

1. 鐵筷子，柳葉過山龍各三錢，一口血二錢浸酒半斤，每次服藥酒一兩，一日二次。

2. 鐵筷子五錢，見血飛五錢，泡酒，每天服藥酒一兩。

治風濕痛：鐵筷子三錢，石楠藤三錢，兔耳風三錢，泡酒四兩，每次服一兩。

治冷氣腹痛：鐵筷子，硃砂蓮，等分研末，每服一錢至二錢，酒吞服。

治腹痛：鐵筷子根皮末一錢，用開水或酒吞服。

治久咳：鐵筷子花三錢，泡開水服。

治癆傷咳嗽：鐵筷子細鬚根一兩，泡酒半斤，每次服藥酒五錢至一兩，經常服用。

治哮喘：鐵筷子細鬚根五分為末，酒吞服。

治婦女腹內血包：鉄筷子 三錢，紅浮萍 一錢，薄荷 一錢，紅花 二錢，煎水內服。

治胃痛：鉄筷子、大木姜子、青藤香、广木香 各 二錢，研末。每次二錢，開水吞服。

禁忌，孕婦忌服。



鐵 筷 子

1.果枝；2.花枝；3.花的縱剖面；4.雄蕊，示正面和背面；
5.花托的頂端去花被后，示中央突出的花柱；6.種子。

折 耳 根

別名：魚腥草，肺形草。

學名及科別：*Houttuynia Cordata* Thunb, 是三白草科植物蕺菜。

植物形态：為多年生草本，野生于田坎土坡，極為普遍。地下有根莖，多節，節上生鬚根，質白嫩而脆，在淺土中蔓延繁殖。民間喜將嫩根莖涼拌作蔬菜吃。地上莖長約一尺，直立或稍匍伏生長，圓柱形，綠色或帶紅色，無毛或僅頂端有稀毛。單葉互生，具肉質葉柄，托葉兩片，膜質，寬而長，下半部與葉柄聯合抱莖。鈍頭，邊緣有紆毛。葉片心臟形，先端漸尖，基部心形，全緣，深綠色或暗綠紅色，掌狀網脈。全草具有特殊腥氣。夏日，莖端或與葉對生處抽花梗，每梗一花序，花序基部具白色花瓣狀的總苞四片，十字形排列，苞片倒卵形，先端鈍圓。花極小，黃色，密集于花穗上，每一小花具微小苞片一枚，着生于花的基部，雌蕊一個呈卵形，柱頭三裂。花後結蒴果，熟時頂裂，內藏極微小的卵形種子。

藥用部分及採集時間：春夏採根或全草入藥。

性味：甘，辛，微寒，無毒。

效用：清熱，解毒，潤肺，止咳，開胃。治肺癆，肺結核，外敷消腫。

方劑：治肺癆咳嗽：

1. 折耳根葉（制法：洗淨放木甑內蒸一點鐘，白天放在屋裏陰干，勿曬太陽，夜間放瓦房上露七夜）二兩，煎水作茶常服。
2. 折耳根半斤，炖肉半斤，常服，或放入豬肚內炖服。
3. 折耳根，白芨，藕節，煎水或炖肉常服。
4. 折耳根一兩，雞蛋兩個，用水一碗煮折耳根，去渣留汁，再將雞蛋打入，煮成蛋花，湯、蛋一次服用，一日一次，

連用五日。

治胃病：折耳根一兩，刺藜根一錢煎水服，連服一星期。

治熱咳：折耳根煎水，加冰糖內服。

婦科調氣活血鎮痛：折耳根二兩，煎甜酒或炖酒服。

治痛腫：折耳根以生菜葉包好。燒熟沖絨氈兌雄黃敷患處。

治乳痛：折耳根，水芹菜，共搗爛敷患處。

治疔瘡：折耳根搗爛敷患處。

治紅淋：折耳根二兩，搗爛，兌淘米水一碗，一次服用。



折 耳 根

1. 植物全形； 2. 花； 3. 果实； 4. 种子。

蜘蛛香

别名：豆豉菜。

学名及科别：系败酱科植物。

植物形态：为多年生草本，山野自生。地下根茎粗壮，密布环环节纹，下生许多鬚根，有败酱似的特殊气味，故俗称豆豉菜（与豆豉草不同。）基叶从地下根茎丛生，叶柄长，其基部膨大呈鞘状，叶呈心脏形或卵圆形，全缘或浅波缘，钝头，羽状网脉，主脉及支脉凸出。叶面深绿色，叶背淡绿色，全体被有白色茸毛。春日抽茎，茎直立，圆形，中空，有节，绿色，有稜线，高一至二尺，茎上叶对生，基部联合抱茎，且多羽状深裂，裂叶卵圆形或披针形，顶端着生许多白色小花，小花有柄，排列呈繖房状的聚繖花序，花冠五裂，下部联合呈筒状，雄蕊三个，伸出花外。雌蕊柱头长，圆柱状，花后结瘦果，其顶上附生有羽毛状的冠毛。

药用部分及采集时间：春夏挖地下根茎入药。

性味：辛，苦，温，无毒。

效用：治气胀、发痧、腹痛：止水泄。

方剂：治发痧、头晕、呕吐、四肢颤抖：蜘蛛香五钱，蒸酒服一、二次。

治胃寒食滞腹痛：蜘蛛香三钱，开水吞服。

治受寒肚痛：蜘蛛香一钱，木姜子三粒（或吴萸一钱）煎水服。

治水泄：蜘蛛香粉末五分至一钱，冲开水服。

治毒疮：蜘蛛香磨醋，外擦患处。



蜘蛛香

1. 植物全形；2. 花；3. 果实；4. 种子。

酸 漿 草

别名：三叶酸、酸咪咪

学名及科别：*Oxalis corniculata* L. 是酢浆草科植物酢浆草。

植物形态：为多年生草本，野生于庭园及路旁。茎细小柔软、匍伏地面生长，长约五寸。叶互生、三出掌状复叶排列成圆形，具长柄，叶柄基部两侧有细小毛茸状的托叶；小叶倒心脏形，从中脉对折，两面对称。边缘为全缘，密生细毛，网状脉。全草均有酸味故名酸浆草。自春至秋，连续开花，叶腋抽花梗，上开黄色小花，五瓣离生，排列呈繖房花序；萼五片，离生，长卵圆形、雄蕊十个，二轮排列，雌蕊一个，柱头五裂。蒴果，长卵形，内藏多数极细的种子，萼宿存。

药用部分及采集时间：本品有红绿两种，以红色的为佳，四季均可采收其全草入药。

性味：酸，寒，无毒。

效用：行血止痛，清热利尿，接骨；治尿结，黄疸。

方剂：治跌打损伤：

1. 酸浆草捣烂，用烧酒调匀外搽。

2. 酸浆草，泽兰，蒸烧酒外搽。

治尿结尿淋：生酸浆草二两，甜酒二两，共同煎水服，日服三次，一、二日收效。

治湿热发黄：酸浆草四两，炖肉服。

治湿热尿血：酸浆草三钱，包谷鬚一两。煮水、取汁当茶喝时常服用。

接骨（未破皮者）：

1. 酸浆草、猪秧秧（小锯锯藤）、等量捣烂敷患处。

2. 酸浆草，蛇莓，等量捣烂敷患处，同时，另各取五钱泡酒内服。

3. 酸浆草、鹅不食草，泽兰叶、等量共捣烂，加适量面粉和成糊状，外包伤处，一日一换。



酸 浆 草

植物全形；2.小叶；3.花；4.萼片；5.雄蕊；6.果实。

鐮 口 草

別名：箭頭草，地黃瓜。

學名及科別：*Viola japonica* Langsd. 是堇菜科植物犁頭草。

植物形態：為多年生小草本，多生于土坎及道旁，地下有白嫩的主根，葉從根部叢生，有長柄，葉柄基部兩側有托葉，葉片長卵形，葉端鈍圓，莖部心形，鈍鋸齒緣，羽狀網脈，背面主脈凸出，葉面綠色，葉背略顯淡紫色，春日葉叢中抽花莖，莖葉互生或對生，披針形細小，頂端單生美麗的淡紫色兩性花，萼五片，花冠五瓣，不整齊，且其中一瓣生管狀花距，雄蕊五枚、雌蕊一枚，子房上位，蒴果，熟則自裂。

藥用部分及採集時間：不分四季採全草入藥。

性味：辛、苦、寒、無毒。

效用：清濕熱，解火毒、治癰腫，疔瘡，提膿生肌。

方劑：治癰，疔，惡瘡：

1. 鐮口草四錢，生甘草二錢、虎耳草三錢，黃花地丁四錢，煎水服。

2. 鐮口草、黃花地丁、荊芥、防風各三錢煎水洗患處。

3. 鐮口草、黃花地丁，生用各一兩共同搗爛、貼患處。

4. 鐮口草（鮮）一握，用冷開水洗淨後，加蜂蜜共搗爛、敷患處，日換兩次。

治濕熱發黃：鐮口草葉為末三錢，用紅酒一杯飯後送服，日服兩次。

治濕熱腸痛下血：鐮口草八錢至一兩（干者五錢至八錢，加水煎湯、飯前服、日服兩次。

治無名腫毒：鐮口草搗爛外敷；并用二兩泡酒內服。

治蛇傷：鐮口草搗爛外敷。



鐮 口 草

1. 植物全形；2. 果实；3. 示裂开；3. 种子。

隔山消

学名及科別： *Cynanchum auriculatum* Royle. 是蘿藦科植物耳叶牛皮消。

植物形态：为多年生草質藤本，多生于阴山丛林或道旁。地下有肥壮的圓柱状根数条，长可达二至三尺，表面黑褐色，断面白色，内含丰富粉質，茎細长柔軟，长约六至九尺，蔓生或纏繞他物上升；綠色、圓柱形，有节，节处膨大，上部多有分枝。全身被有短毛。叶对生，有柄，叶片广卵形，先端尖，全緣或微波緣，基部为深心形，兩側呈圓耳状，下延或向內弯入，有时两耳相遇，叶面深綠色，叶背淡綠色，羽状网脉。七、八月間，叶腋抽繖形花序：萼五片、几全緣、裂片綫状，披針形、花瓣五片深裂、裂片广披針形，此外，有副瓣五片，且与雄蕊連生，雄蕊五枚、花药二室，每室有一黃色卵形花块；雌蕊一个，子房上位，花柱二枚分离，但到頂部又联合成盘状，柱头五裂，花后結长角形蓇葖果，圓形，中間大，兩端尖，平滑无毛，內藏多数种子，种子一端有許多发絲光的长茸毛。

药用部分及采集時間：夏秋間掘块根入药。

性味：甘、苦、平、无毒。

效用：消食积，去飽胀。

方剂：治食积腹水：

1. 隔山消 一錢，兌水吞。

2. 隔山消 一两，地朋草 一两，辰沙草 一两、研末、每用一錢开水吞服。

治食瘡：隔山消細末 五分，地牯牛 三个，去头脚焙焦研末，混合，用米汁送下。

治食积胃痛，消食，健胃：隔山消 五錢，万年荬 五錢，研末混合，每次一錢，开水吞服。

治胃气痛年久未愈：隔山消 二錢，万年荬 一錢，各药研細混合，开水吞服，每日三次，每次一錢。

治多年老胃病：隔山消 一两，鸡屎藤 五錢，炖猪肉服。



隔 山 消

- 1.花枝；2.根；3.花；4.花萼；5.副冠；6.雌雄合蕊的側面觀（已去副冠）；7.雄蕊和花粉塊；8.雌蕊；9.果实。

酸 湯 杆

别名：土地榆，黄地榆。

学名及科别：Polygonum chinense L. Var. thunbergianum Meisn. 系蓼科植物赤地利。

植物形态：为多年生直立或半蔓生的灌木，多生于山野水沟边路旁或阴湿地。茎圆柱形，长二至三尺，有节，下部木质，上部草质，红绿色。单叶互生，具短柄，托叶变成鞘状包着茎，叶片广卵形或卵状椭圆形，先端尖或短尖，全缘，基部截形，叶面浓绿色，叶背淡绿色，羽状网脉。草质，粗糙。夏秋间茎端或叶腋抽圆锥花序；花小，两性，整齐；花被白色，四瓣深裂；雄蕊八个，雌蕊一个，子房上位，柱头三裂。花后结三棱形小果。

药用部分及采集时间：根部入药，随时可采。

性味：苦、涩、平、无毒。

效用：清热、止痛，消疮肿。

方剂：治红白痢：酸汤杆三钱，何首乌三钱，红茶花三钱，天青地白二钱，煎水兑红糖吃。

风寒闭热：酸汤杆七钱，夏枯草三钱，头晕药五钱，一支箭三钱，煎水服。

经行腹痛：酸汤杆五钱 泡酒服。

痈肿疼痛：酸汤杆、土大黄为末调浓茶外敷。



酸 湯 桿
1.花枝；2.花。

矮 陀 陀

别名：地柑子。

学名及科别：*Ardisia brericaulis* Diels. 系紫金牛科植物矮陀陀。

植物形态：为常绿矮小灌木，山野自生。地下有木质茎横走，圆柱形，弯曲。地上茎有多数叶痕，叶互生，有长柄，近似圆柱形。叶片卵圆形、长卵形或卵状披针形，边缘全缘或浅波状，先端尖，叶面深绿色，叶背灰绿色，羽状网脉。春日叶腋抽花梗，上生一至三朵小花，单生或呈聚繖花序；蒴果，扁球形，成熟时瓣裂，内藏数粒肾脏形的种子，背面隆起，腹面内凹，且隐约可见种脊，其一端有一小突起。

药用部分及采集时间：全草入药，四季均可采收。

性味：辛、甘、温、无毒。

效用：长力气，壮筋骨，治跌打损伤，止咳，治胃痛。

方剂：治跌打损伤：矮陀陀二两泡酒半斤，每次服五钱药酒。

治胃痛：矮陀陀根打末，每次一钱开水送服特效。

治癆伤咳嗽：矮陀陀，紫金牛，等量研末，每服一钱，白开水送下。



矮 陀 陀

1. 植物全形；2. 果实；3. 种子。

蓼 子 草

别名：山馬尾，山高粱。

学名及科別： *Lysimachia clethroides* Duby. 是报春花科植物珍珠菜。

植物形态：为多年生草本，高約三尺。野生于山林中或山野道旁。地下根分枝，主根不明显紅黃色，地上茎直立，圓柱形、綠色或綠紅色，叶互生，有短柄或无柄。叶片橢圓形或披針形，綠色或紅綠色，邊緣全緣，但有細柔毛，先端尖，羽状网脉。夏日，茎端密生白花，排列呈总状花序，微向下弯，形如高粱之穗，萼綠色五裂，花冠白色五瓣，整齐，雄蕊五个，花药背着，雌蕊一个，子房略膨大，呈橢圓形，柱头头状，花后結蒴果。

药用部分及采集时间：根部入药，夏秋季采收。

性味：辛、溫、无毒。

效用：行血調經，外洗消肿。

方剂：治月經不調：蓼子草、小血藤、大血藤、当归、牛膝、紅花、紫草，各二錢，泡酒一斤，每服药酒五錢至一两。
消脚肿：蓼子草茎叶熬水外洗。



蓼子草

1. 植物全形；2. 花；3. 雄蕊；4. 雌蕊。

閻 王 刺

别名：牛王刺，葯王刺。

学名及科別：Caesalpinia sepiaria Roxb. 是豆科植物云实。

植物形态：为落叶灌木，生于田野及道旁，枝叶粗壮，全株密生钩状短刺，高可达丈余。叶互生，为大型二回数羽状复叶，小叶对生，具短柄，椭圆形。羽状网脉，叶背主脉明显，叶端微凹，基部楔形或截形。全缘，叶面深绿色，叶背淡绿色。春末夏初新枝梢上抽花茎，花轴长约一尺，上生多数花朵，花有长柄，排列呈总状花序；花冠鲜黄色，五瓣离生，其中四片大，一片细狭，呈假蝶形，萼五片离生，背面绿黄色，腹面黄色，花开后萼多反卷，雄蕊十枚基部略为联合，包围雌蕊，花丝扁而粗具白色茸毛，花药黑褐色，雌蕊一枚，子房绿色扁平。花后结荚果，长约二寸，扁而阔，初呈绿色，成熟干燥后，呈黑褐色，内含数粒种子。

药用部分及采集时间：不分四季，掘根去粗皮入药，以赤色者为好。

性味：根：辛、温、无毒；子：辛、温，有小毒。

效用：发散风寒，宣透麻疹，治风寒湿痹。

方剂：发表风寒：阎王刺根一两，煎水服。

治感冒：

1. 阎王刺三钱，紫苏三钱，香樟根三钱，姜三片，葱五棵，煎水服。
2. 阎王刺五钱，紫苏三钱，椿菜皮三钱，木通三钱，地柏枝三钱，鱼鳅串三钱，马鞭草五钱，生姜三片，葱头三个，煎水服。
3. 阎王刺三钱，头晕药二钱，煎水服（无汗重加阎王刺；体沉重，加头晕药；咳嗽加五皮风）。

治小儿感冒下痢：阎王刺一钱，辰沙草五钱，夏枯草三钱，万年芥二钱，小茴香根一钱，大木姜子三粒，煎水服。

另外，单用渊头鸡三片煎水服。

治麻疹未透：閻王刺二錢，升麻二錢，馬鞭草二錢，茅草根三錢，水灯心二錢，牛毛毡二錢，紅稗一錢，斑竹笋壳一张（烧灰），煎水服二、三副。

治风湿关节痛：閻王刺根五錢，牛膝五錢，威灵仙五錢，透骨香五錢，白龙鬚一錢，大风藤五錢，追风伞五錢，骨碎补五錢，石菖卜五錢，泡酒常服，每服一两。

治急慢惊风：閻王刺（去粗皮后的根皮），三春柳，紫苏叶，露蜂房儿；各等量，炕脆研末，每次三至五分，用开水吞服。

附：閻王刺虫（閻王刺茎、根内所生的虫，形状大小如蚕，头紅身白。）

治麻疹内陷危症：閻王刺虫一条，（大的半条）烘脆为末，开水吞服。



閻 王 刺

1.花枝；2.花；3.雄蕊；4.雌蕊；5.果实；6.种子。

鴨 舌 草

別名：鴨舌子

學名及科別：*Sagittaria pygmaea* Mig. 是澤瀉科植物瓜皮草。

植物形態：為多年生草本，野生於水田及沼澤淺水中。地下鬚根頗多，白色有絲光，中空且有密節，不分枝。鬚根雜有橫行根莖，形與根相同，但略大，特別長，在另一端萌發新株。單葉聚生於基部，葉片狹長呈帶狀披針形，先端鈍尖，全緣，質柔軟而厚，中多空隙，有海棉狀感覺，表面綠色，但靠近根部呈白色，並有“井”字形花紋。夏秋間葉叢中抽花梗，高約五至六寸，花單性，雌雄同株，雌花無柄，多聚生於花序下層，形成輪狀。雄花有長柄，具橢圓形苞葉三至五個，輪生於花莖上，多為兩輪，萼三片，綠色，花瓣三片，形較大，白色，雄蕊十二個，有黃色花藥，花絲短而肥大。果實具鱗片狀的翅，聚合成球狀，成熟時散落。

藥用部分及採集時間：夏秋採全草入藥。

性味：甘、微苦、寒、無毒。

效用：清熱解毒，治喉痛，外敷癰腫。

方劑：清喉火；鮮鴨舌草一兩，煎水吃；同時，另取一部分敷頰下。

治無名腫毒：鮮鴨舌草搗爛外敷。



鴨 舌 草

1. 植物全形; 2. 根放大示节; 3. 花序; 4. 雄花; 5. 雌花; 6. 果实。

轉 珠 蓮

別名：竹葉黃精。

學名及科別：*polygonatum Sibiricum Redoute*. 是百合科植物
東北黃精。

植物形態：為多年生草本，高約三尺，山野自生。地下根莖肥大，具有許多環節，每節連接處縮小，且較為平滑，全形頗似黃精。根莖上散生鬚根，地上莖圓柱形草質直立，不分枝，葉為四至七片，簇生或輪生，無柄，綫狀披針形或披針形，先端銳尖，全緣，深綠色，葉面略帶光澤，直走平行脈，夏日葉腋抽梗，每節抽二至六個花梗，每一花梗頂端開二至四朵小花，花下垂，花被六片，二輪排列，綠白色或白色；雄蕊六個，子房上位，柱頭有白毛，花後結球形漿果，成熟後呈黑色。

藥用部分及採集時間：夏秋間採地下根莖入藥。

性味：甘、平、無毒。

效用：補氣補血，消炎。

方劑：補虛弱，治痔瘡，腳抽筋：轉珠蓮三錢至五錢，炖肉一斤，內服。



轉 珠 蓮

1. 植物全形；2. 花解剖后示部分雄蕊和雌蕊；3. 果序。

翳子草

学名及科別： *Pratia begonitolia* Lindl. 系桔梗科植物。


植物形态：为一年生草本，多生于阴湿田坎边或山林阴处。茎細小，圓柱形，长一至二尺，綠色，匍伏生长，着地部分节上生細根。单叶互生，有小柄，叶片心脏形，先端鈍尖，边緣有鋸齿，基部心形，綠色或帶紅色，掌状网脉，夏日叶腋抽小花梗，花单生，萼五片綠色；花冠鐘状五裂，紫蓝色，雄蕊五枚；雌蕊一个，子房下位，花后結橢圓形漿果，成熟时呈深紫色，內藏多数种子；种子細小，鮮紅色，卵圓形。

药用部分及采集時間：夏日采全草入药。

性味：甘，苦，平。

效用：解毒，去翳。

方剂：治目翳，目受损伤紅肿，鮮翳子草搗烂外敷。



翳 子 草

1. 植物全形；2. 叶；3. 果实；4. 果实纵断面和横断面；5. 种子。

鵝 不 食 草

別名：地胡椒；二郎劍。

學名及科別：*Myriogyne minima* Less. 是菊科植物石胡荽。

植物形態：為一年生小草本，高約二至四寸，野生於路旁田野濕潤地帶。莖直立或平臥，圓柱形，綠色，着地部分處處生鬚根，基部或葉腋多有分枝，單葉互生，無柄，葉片倒卵形或長橢圓形，綠色，肉質，羽狀網脈但不太明顯，先端鈍尖，有兩淺裂，基部漸狹，下半部全緣。夏日葉腋生細小頭狀花序，呈小球形，有短花梗，外被總苞二列，花序邊緣為雌花，中部為兩性花，花後結細小瘦果。

藥用部分及採集時間：夏秋採全草入藥。

性味：辛，涼，無毒。

效用：清熱，消炎，開竅，行血，治鼻淵消癰腫。

方劑：治傷風頭痛，鼻塞，眼翳：鵝不食草（鮮或干均可）搓揉，嗅其氣，即打噴嚏，每日二次。

治目翳及小兒疳積，鵝不食草一錢，蒸雞肝內服，數次見效。

治風熱頭暈，眼黑，鼻塞，耳鳴：鵝不食草（干）三錢，研成細末，加白糖一兩，沖開水內服。

治瘡疾：

1. 新鮮鵝不食草捻成團，塞入鼻內，初有感噴嚏，宜稍忍耐，發病前塞十分鐘。

2. 鵝不食草一兩，煎水，於發瘡疾前一小時服下，三至五次即愈。

治牛皮癬：鵝不食草搗爛外搽數次特效。

治多年瘡瘡：鵝不食草，蛇倒退，炕干研末，兌麻油調搽。

治痔瘡：鮮鵝不食草二兩，無花果葉五、六錢，煎水，先薰

过再洗痔疮。

治潰烂疮毒：鵝不食草一錢，芙蓉花叶一錢，独脚蓮一錢，各药研成細末外敷。

治白口疮：鵝不食草一錢，冰片五分，研成細末，混合，撒布患处。

治乳痛：鵝不食草三錢，芙蓉花叶三錢。搗烂外敷。


治鼻炎：鵝不食草为末，加少許冰片，吹入鼻內，一天二次。

治跌打损伤：鵝不食草三分至五分，兌酒吃。

治膀胱結石：鵝不食草二兩，洗淨搗汁，加白糖少許，一次服完。

治跌打伤肿：鵝不食草搗汁兌燒酒揉搽。

治妇女月經期小腹痛：鵝不食草五錢，小血藤四錢，煎水，加白酒为引，內服。



鵝不食草

1. 植物全形；2. 花枝；3. 花；4. 果序；5. 果实。

饅 鷄 尾

別名：凤尾金星，猪棕漆（根），七星剑。

学名及科別：*Microsorium fortunei* Ching. 是蕨科植物福氏星蕨。

植物形态：为多年生常綠草本，喜生于阴湿山林的峭壁上或石隙中。地下茎圓形細长，匍伏或攀緣生长。表皮多成綠色，有疏散的棕色斑点，下側生多数鬚根，棕褐色，披有棕色茸毛，茎幼嫩时疏生鱗叶，以后脫落，叶多呈长披針形，长约一尺至一尺五寸，具坚韧性的长柄，先端銳尖，基部楔形，全緣或有微波，叶背淡綠色，主脉略为凸出，叶面深綠色，主脉凸出尤为显著。春末夏初，叶背主脉兩側着生数十对圓形孢子囊堆，对称排列极为整齐，初呈淡黃色，成熟时，孢子囊盖开裂，呈現棕色。

药用部分及采集時間：根茎或全草入药，四季皆可采收。

性味：苦寒，无毒。


效用：涼血止血，清热解毒，风湿热痛。

方剂：治火咳，火淋，止鼻血：饅鷄尾三錢至五錢，煎水吃。

治腸风下血（內痔出血）：饅鷄尾根茎二兩，猪棕草一兩，煮猪腸，腸和糖吃，并喝湯。

治火烧伤：饅鷄尾全草为末，調蜂糖敷患处。

治风湿关节热痛：饅鷄尾根（干）二兩，泡酒一斤，每天服二次，每服約一两。



雞尾

騷 羊 古

別名：山當歸，蛇倒退。

學名及科別：*Pimpinella diversifolia* Dc. 是繖形科植物苦蕒菜。

植物形態：為多年生草本，山野自生。根分數股，並有許多支根。根葉着地叢生，有長柄，葉片廣心臟形，先端尖，邊緣鋸齒狀，葉基心臟形。夏日抽莖，高可達二至三尺，草質綠色，圓柱形，表面有細縱紋，有節，多不中空而有髓，節間長一至五寸，莖端時有分枝，莖生葉大多分裂呈三出復葉，有長柄，葉柄基部膨大成鞘狀包着莖，頂端葉片則三數深裂，葉片兩側的常呈菱形，中間的為卵形，先端尖，鋸齒緣，綠色羽狀網脈。全株有短毛。六、七月間，莖頂開復繖形花序，每一小繖形有花十至十五個，具小總苞片一至四個，花細小，花瓣五片，白色，先端略向內卷曲，雄蕊五個，着生于花瓣上。花後結雙懸果，呈卵圓形，且微扁平，表面粗糙，有稜綫。

藥用部分及採集時間：夏秋間採全草入藥。

性味：辛，溫，無毒。

效用：溫中散寒止痛，治中寒、發痧、胃痛、腹痛。

方劑：治陰寒發痧腹痛：騷羊古一錢，開水或酒吞服，半小時至一小時見效。

治中寒縮陰腹痛：騷羊古根三錢，頭暈藥二錢，各藥研細混合，酒水各半吞服，服後蓋棉被發汗。

治胃氣痛，開胃：騷羊古五錢，廣木香二錢，辰沙草五錢，研細混合，開水吞服，每日三次，每次一錢。



騷 羊 古

糯米藤

别名：鉄箍草。

学名及科别：Memoralis birla Wedd 是蕁麻科植物蔓苧麻。

植物形态：为多年蔓生草本，野生于山野或路旁草丛中，地下有粗大的主根。茎细长多蔓生，淡赭色，长约二至五尺，叶对生，有短柄或无柄，叶片卵形或卵状披针形，先端尖，基部微凹或心形，全缘，网状脉极明显，其中有三至五条纵行脉，全身披有棕色毛茸。夏日，叶腋簇生黄白色花，呈轮繖花序，花单性，雌雄同株，下部为雌花，上部为雄花，雌花筒形，子房一个，花柱二裂。雄花，花被整齐，五瓣离生，内藏雄蕊五枚，未成熟时，雄蕊向内卷缩，成熟时，借助于弹力向四周伸展，花丝有节纹，花药二个，生于花丝先端，花后结黑色瘦果。

药用部分及采集时间：根及全草入药，随时可采。

性味：酸，辛，寒，无毒。

效用：外用治火疔、九子痒、恶疮。

方剂：治毒疮火疔：糯米藤鲜叶洗净捣烂，敷疮周围。

治无名肿毒，九子痒：糯米藤根一两，捣烂外敷。

治妇女小腹痛：糯米藤根二两，炖肉服用。



糯米藤

1. 植物全形；2. 花苞；3. 半开放的花；4. 全开的花；5. 果实。

附 录

編繪者:

袁家璣 陈震標 李兴彬 (貴阳第一卫校)
曾兼善 (葯檢所)

審查者:

陈仲寅 陈芳国 胡玉森 陈錫彬 范超鈞 唐青云
馬玉貞 楊济中 彭桂珍 古紹清 田明德 吳素珍

獻方獻葯人:

唐森荣 苟定邦 蔡世康 石仲香 张登云 周伯群
黃明全 袁紹荣 金承先 袁守成 王奎华 张义荣
张自修 黃童璧 胡成功 阮国良 黃連貞 陈坤倫
白承超 白忠英 邓良才 熊开祥 蒙素华 徐和清
张玉岐 彭潤清 赵云洲 岳素臣 金泽仓 焦玉珍
段中荣 王金安 丁惠民 袁素文 王明珍 謝东海
余茂春 方海洲 白开亮 彭自廉 罗济先 楊文頤
周鑫臣 田立尧 张兴成 梁洪方 邓素珍 周素华
杜銀洲 李^平秀 何登輝 张有才 楊少伯 陈亚凤
李 云 王少洲 徐淑仙 郑廷珍 晏桔秀 张素珍
龙烂五……等一百四十三人

(审核人都参加了献方献葯, 这里不再列名)

編寫本書主要参考文献:

村越三千男^{内外}植物原色大图鉴

昭和十四年版

賈祖章等: 中国植物图鉴

一九五八年二月版

裴 鉴等: 中国葯用植物志一至六册

一九五一年至一九五八年出版

- 傅書遐：中国主要植物图志（蕨类植物門）
一九五七年十二月版
- 中国科学院植物研究所：中国主要植物图志（豆科）
一九五五年十二月版
- 陈立卿：广西中獸医药用植物
一九五九年二月版
- 刘慎謩等：东北药用植物志
一九五九年三月版
- 刘慎謩等：东北木本植物图志
一九五五年二月版
- 陈 嵘：中国树木分类学
一九五三年版
- 侯寬昭等：广州植物志
一九五六年六月版
- 乐天字等：陝甘宁盆地植物志
一九五七年六月版
- 楊济秋等：貴州民間方药集
一九五八年四月版

中科院植物所图书馆



S0042746

贵阳民间药草

贵阳市卫生局編著

*

贵州人民出版社出版

(贵阳市延安中路3号)

(贵州省书刊出版业营业许可证出字第001号)

贵州省新华书店发行 各地新华书店經售

贵州人民印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印張：9 字数：131,900

1959年9月第1版

1959年9月第一次印刷

印数：00,001——10,150册

內 容 提 要

本书收集了一百二十六种民間藥草。这些藥草是貴阳市民間医长期使用而效用顯著的。根据上山采集的新鮮品种繪制图谱，并詳細地敘述这些藥草的植物形态、生长地点、药用部分和采集时间、性味、效用等。每种藥草都有很多方劑，而这些方劑又是經過整理、总结的有效的主要方劑。

統一書号：14115·22 (1110)
定 价：(9)一元一角